

164. – *niger* (H. S.), selten, auf feuchten Wiesen an *Peucedanum*-Arten, auch in Sa. selten gefunden. Europäisch-mediterrane Art.
Fundorte: 75: Eberswalde KONOW; 77: Prignitz JAAP; 78: Paulinenaue SCHUMACHER (1913)/VII 32; 82: „Bln.“ SCHIRMER & SCHUMACHER (1911).
165. *Orthocephalus brevis* (PZ.), nur eine Angabe, nach WAGNER nur im Süden, auf Trockenwiesen (an *Campanula rapunculoides* L.), auch in Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-sibirische Art.
Fundort: „Brandenburg“ SCHUMACHER (1913).
166. – *coriaceus* (F.), sehr selten, nach WAGNER häufig und verbreitet an Compositen auf Wiesen, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-mediterrane Art.
Fundorte: 77: Schönberg VII 1875 KONOW; 82: „Bln.“
167. – *saltator* (HAHN), häufig, auf Wiesen an Compositen, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Holarktische Art.
Fundorte: 74: Geesow WAGNER (1941)/VII 67 GÖLLNER; 77: Prignitz JAAP, Schönberg VII 1877 KONOW, Triglitz WAGNER (1939); 78: Helligensee VII 19 HÖHNE, Nauen VII 07 SCHUMACHER; 79: Podelzig VI 67 GÖLLNER; 80: Frankfurt VII 28 u. VI 29 u. VI–VII 30 u. VI 31 SCHUKATSCHEK, Lebus VI 67–68 GÖLLNER, Mescherin WAGNER (1941); 81: Glindow VII 42 GRIEP, Gr. Machnow VI 32 SIEFKE, Kl. Machnow VII 12 BOLLOW, Mittenwalde VII 65 GÖLLNER, Osdorf VI 20 STICHEL, Sperenberg VII 30, Stahnsberg VI 43 GRIEP, Teltow IV 31; 82: „Bln.“ BAERENSPRUNG, Grünheide AULMANN.
168. – *vittipennis* (H. S.), häufig, an krautigen Pflanzen besonders *Chrysanthemum*, *Achillea*, auch in Meckl., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-sibirische Art.
Fundorte: 74: Brodowin VI 32/VIII 65 DIECKMANN, Chorin VI 32, Geesow WAGNER (1941); 78: Nauen VII 07 SCHUMACHER; 79: Buckow SCHIRMER & SCHUMACHER (1911), Mühlenbeck VI 32/VII 33 SIEFKE, Rüdersdorf VII 24/VI 68 GIESE, Schildow GREINER & SIEFKE (1933), Strausberg Torfhaus VII 33 SIEFKE/VII 65 GÖLLNER; 80: Frankfurt VI 28 u. 30 SCHUKATSCHEK, Lebus VI 67–68 GÖLLNER, Schiffmühle VII 69 GÖLLNER; 81: Bornim VII 44 GRIEP, Glindow VII 40 u. 42 GRIEP, Mellen VII 31, Mittenwalde VII 65 u. VI 67 GÖLLNER; 82: Baumschulenweg SCHUMACHER (1912), „Bln.“ BAERENSPRUNG, Wernsdorf VII 67 SCHADE.
169. *Malacocoris chlorizans* (PZ.), nicht selten gefunden, nach WAGNER verbreitet und häufig, an Laubbälzern (*Corylus*, *Alnus* u. a.), auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-maghribische Art.
Fundorte: 77: Prignitz JAAP, Schönberg X 1877 KONOW; 78: Bredow SCHUMACHER (1913), Finkenkrug SCHUMACHER (1913), Hermsdorf VII 32/VIII 44; 79: Müncheberg SCHUMACHER (1913), Schildow IX 44; 80: Gartz WAGNER (1941), Lebus VIII 68 GÖLLNER; 81: Bohnsdorf ZELETZKI & RINNHOFFER (1966), Lichterfelde V. KELER IX 52, Potsdam VII 41 GRIEP; 82: „Bln.“ BAERENSPRUNG/SCHUMACHER (1913).
170. *Heterocordylus erythrophthalmus* HAHN, sehr selten, an *Rhamnus cathartica* L., auch in Meckl. und Thür. gefunden. Europäisch-mediterrane Art.
Fundorte: 81: Golm VII 41 GRIEP, Potsdam VII 42 GRIEP.
171. – *leptocerus* (KB.), nur zwei Funde, nach WAGNER nicht häufig, an *Genista* und *Sarothamnus*, auch in Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäische Art.
Fundorte: 77: Prignitz JAAP; 81: Glindow VI–VII 43 GRIEP.
172. – *tibialis* (HAHN), nicht selten, an *Sarothamnus*, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-mediterrane Art.
Fundorte: 77: Schönberg VI 1876 KONOW; 78: Finkenkrug VI 02 ENDERLEIN/VI 28; 79: Hönow VI 20 HÖHNE, Mehrow IV 33 LASS, Rüdersdorf VI 68 GIESE; 81: Gr. Machnow VI 32 SIEFKE, Lehnin VI 1886 BREDDIN, Mittenwalde VI 32/VI 65 u. VII 67 GÖLLNER, Potsdam V 53 GRIEP; 82: „Bln.“ SCHUMACHER (1914), Dubrow VI 33 SIEFKE.
173. – *tumidicornis* (H. S.), selten, nach WAGNER verbreitet und stellenweise häufig, an *Prunus spinosa* L., auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-maghribische Art.
Fundorte: 74: Chorin SCHUMACHER (1913); 75: Fürstenberg VI 1889 KONOW; 79: Podelzig VI 67 GÖLLNER, Rüdersdorf SCHUMACHER (1913); 81: Teltow VI 31; 82: „Bln.“ BAERENSPRUNG/SCHUMACHER (1913).
174. *Heterotoma meriopterum* (Scop.), nicht selten gefunden, nach WAGNER häufig, verbreitet, an Laubbälzern und krautigen Pflanzen, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Holarktische Art.
Fundorte: 77: Prignitz JAAP; 78: Hermsdorf VIII 44; 80: Gartz WAGNER (1941), Lebus VIII 68 u. 70 GÖLLNER; 81: Bochow ZELETZKI & RINNHOFFER (1966), Eiche VII 39 GRIEP, Glindow VII 53 GRIEP/ZELETZKI & RINNHOFFER (1966), Mittenwalde VII 67 GÖLLNER, Pfaueninsel STICHEL (1926), Potsdam VII 46 GRIEP; 82: „Bln.“ BAERENSPRUNG/VIII 10 OLDENBERG, Fürstenwalde VIII 70 STEIN, Gr. Besten VIII 22.
175. *Pseudoloxops coccineus* (M.-D.), nur wenige Funde, an *Fraxinus*, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. vereinzelt gefunden. Europäische Art.