

- (1926), Potsdam VI 47 u. VII 50 GRIEP, Schulzendorf VII 37 ZWICK; 82: Baumschulenweg SCHUMACHER (1912), „Bln.“ VII 28, Friedrichsfelde IX 71 SCHULZE.
190. – *ericetorum* (FALL.), selten, nach WAGNER häufig und verbreitet, an *Calluna*, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-sibirisch-mediterrane Art.  
Fundorte: 77: Prignitz JAAP; 78: Lehnitz IX 55 u. VII 60 KNAUSS; 80: Mescherin WAGNER (1941); 81: Glindow VIII 31, Mittenwalde VIII 66 u. IX 67 GÖLLNER, Pfaueninsel STICHEL (1926), Saarmund IX 52 GRIEP, Teltow VIII 31; 82: Baumschulenweg SCHUMACHER (1912), „Bln.“ BAERENSPRUNG.
191. *Cyrtorrhinus caricis* (FALL.), nur eine Angabe, nach WAGNER selten und zerstreut, an Juncaceen und Cyperaceen, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-sibirische Art.  
Fundort: „Brandenburg“ SCHUMACHER (1919).
192. *Fieberocapsus flaveolus* (REUT.), nur ein Fund, zwischen Gras und Schilf in Sümpfen, in den Nachbargebieten nicht gefunden. Boreo-montane Art.  
Fundort: 78: Brieselang SCHUMACHER (1923).
193. *Mecomma ambulans* (FALL.), selten, nach WAGNER verbreitet und nicht selten, auf krautigen Pflanzen an schattigen und feuchten Orten, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Holarktische Art.  
Fundorte: 74: Chorin SCHUMACHER (1913); 75: Werbellinsee VII 69 ECKERT; 77: Prignitz JAAP, Schönberg VII 1874 KONOW; 79: Schildow GREINER & SIEFKE (1933); 81: Glindow VIII 56 GRIEP, Potsdam VI 46 u. VI 47 GRIEP; 82: „Bln.“ BAERENSPRUNG/VII 07 KUHLGATZ/SCHUMACHER (1913).
194. *Globiceps sphegiformis* (ROSSI), sehr selten, auf Laubhölzern, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-mediterrane Art.  
Fundorte: 78: Finkenkrug; 82: „Bln.“ (alte Funde) SCHUMACHER (1913).
195. – *cruciatus* (REUT.), nicht selten, an krautigen Pflanzen und Gebüsch, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-sibirische Art.  
Fundorte: 74: Brodowin VI 32, Geesow WAGNER (1941); 77: Prignitz JAAP, Triglitz WAGNER (1939); 79: Rüdersdorf VII 38 LASS; 80: Frankfurt VIII 29 u. VII 31 SCHUKATSCHEK, Gartz WAGNER (1941)/VII 67 GÖLLNER, Lebus VI 67 u. 68 GÖLLNER, Mescherin WAGNER (1941), Schiffmühle VII 69 GÖLLNER; 81: Mittenwalde VII 67 GÖLLNER; 82: „Bln.“.
196. – *flavomaculatus* (F.), selten, an krautigen Pflanzen (Leguminosen), auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-sibirische Art.  
Fundorte: 77: Triglitz WAGNER (1939); 78: Finkenkrug VI 18 OLDENBERG; 79: Buckow SCHIRMER & SCHUMACHER (1911), Rüdersdorf SCHIRMER & SCHUMACHER (1911); 82: „Bln.“.
197. *Blepharidopterus angulatus* (FALL.), häufig, an Laubgehölzen, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Holarktische Art.  
Fundorte: 75: Fürstenberg X 1890 KONOW; 77: Prignitz JAAP, Schönberg X 1877 KONOW, Triglitz WAGNER (1939); 79: Podelzig VI 67 GÖLLNER, Schildow VIII 44, Summt VIII 71 GÖLLNER; 80: Reitwein VI 67 GÖLLNER; 81: Bohnsdorf ZELETZKI & RINNHOFFER (1966), Glindow VII 41 GRIEP, Mittenwalde IX 67 GÖLLNER, Nudow VII 37 ZWICK, Pfaueninsel STICHEL (1926); 82: „Bln.“ BAERENSPRUNG, Friedrichshain IX 19 HÖHNE, Müggelheim X 68 SCHULZE; 83: Lakoma IX 71 DIECKMANN, Merzdorf IX 71 ZEBE.
198. *Cyllocoris histrionicus* (L.), häufig, im Frühjahr an Eichen, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäische Art.  
Fundorte: 77: Prignitz JAAP, Schönberg VI 1876 KONOW, Triglitz WAGNER (1939); 78: Finkenkrug V 18 OLDENBERG/VI 28/VI 29 OLDENBERG, Nd. Neuendorf VI 46, Staaken VIII 36 LASS; 79: Buckow SCHIRMER & SCHUMACHER (1911), Freienwalde V 66 GÖLLNER, Mühlenbeck VI 44, Strausberg Torfhaus VII 65 GÖLLNER; 81: Hermannswerder VI 41 GRIEP, Jünsdorf V 47, Mittenwalde VI 65 u. V-VII 66 GÖLLNER, Pfaueninsel Stichel (1926), Potsdam PAPE, Sacrow OLDENBERG; 82: „Bln.“ BAERENSPRUNG/VI 09 LICHTWARDT/SCHUMACHER (1914); – Weißwasser V 66 ENGELMANN.
199. *Dryophilocoris flavoquadrinaculatus* (DEG.), häufig, an Eichen, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäische Art.  
Fundorte: 77: Prignitz JAAP; 78: Finkenkrug SCHIRMER & SCHUMACHER (1911)/V 18/V 20 u. 23 OLDENBERG/V 28, Lehnitz VI 62 u. 64 KNAUSS, Nd. Neuendorf V 31 LASS/46; 79: Buckow SCHIRMER & SCHUMACHER (1911), Freienwalde V 66 GÖLLNER; 81: Grunewald V 14, Hermannswerder VI 41 GRIEP, Jünsdorf V 47, Mittenwalde V 66 GÖLLNER, Pfaueninsel STICHEL (1926), Potsdam PAPE/V 22 OLDENBERG; Wannsee V 52 V. KELER; 82: „Bln.“ BAERENSPRUNG/SCHUMACHER (1914)/58 WINKLER, Gr. Besten V 23, Weißensee V 60 SCHULZE; Weißwasser V 66 ENGELMANN.
200. *Pilophorus cinnamopterus* (KB.), nicht selten, nach WAGNER häufig und verbreitet, an *Pinus*, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäische Art.  
Fundorte: 74: Geesow WAGNER (1941); 77: Prignitz JAAP; 78: Paulinenaue IX 34; 79: Mühlen-