

- beck IX 34, Strausberg VII 33 SIEFKE; 80: Gartz WAGNER (1941), Reitwein VIII 71 GÖLLNER, Schiffmühle VII 69 GÖLLNER; 81: Glindow VIII 41 GRIEP, Mittenwalde X 65 u. 67 GÖLLNER, Pfaueninsel VIII 44; 82: „Bln.“ BAERENSPRUNG/VIII 1891 TETENS, Rahnsdorf VI 1890 TETENS.
201. – *clavatus* (L.), nicht selten, auf Laubhölzern, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Holarktische Art.
Fundorte: 75: Fürstenberg IX 1877 u. VI 1889 KONOW; 77: Prignitz JAAP, Triglitz WAGNER (1939); 78: Finkenkrug SCHIRMER & SCHUMACHER (1911); 79: Hönow VII 30, Rüdersdorf VIII 30, Schildow IX 35 SIEFKE; 81: Golm VII 41 GRIEP, Grunewald VIII 52 V. KELER, Hermannswerder IX 40 GRIEP; 82: „Bln.“ BAERENSPRUNG.
202. – *confusus* (KB.), nur wenige Funde, nach WAGNER nicht selten, an Laubhölzern (besonders Weide), auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-sibirische Art.
Fundorte: 79: Buckow SCHIRMER & SCHUMACHER (1911), Herzfelde VII 33 SIEFKE; 80: Lebus VIII 67–71 GÖLLNER; 81: Hermannswerder VII 41 GRIEP, Werder VII 41 GRIEP; 82: „Bln.“ BAERENSPRUNG.
203. – *perplexus* (DGL. SC.), häufig, an Laubhölzern, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-mediterrane Art.
Fundorte: 75: Eberswalde IX 71 DIECKMANN, Fürstenberg VIII 1888 KONOW; 78: Hermsdorf VIII 44, Lehnitz X 60 KNAUSS; 79: Rüdersdorf ENDERLEIN (1908)/VIII 30, Spechthausen ZELETZKI & RINNHOFFER (1966); 80: Lebus VIII 69 GÖLLNER; 81: Bohnsdorf ZELETZKI & RINNHOFFER (1966), Golm VII 41 u. VIII 42 GRIEP, Grunewald IX 52 V. KELER, Hermannswerder VII 41 GRIEP, Mittenwalde VII 66 GÖLLNER, Potsdam VII–VIII 41 GRIEP, Rehbrücke VII 41 GRIEP, Stahnsdorf VII 40; 82: Friedrichshagen 1887.
204. *Cremnocephalus alboineatus* REUT., selten, zoophag auf *Pinus*, auch in Meckl., Thür. und Sa. gefunden. Europäische Art.
Fundorte: 77: Prignitz JAAP, Triglitz WAGNER (1939); 81: Mittenwalde VI 66 u. 67 GÖLLNER, Pfaueninsel STICHEL (1926), Potsdam VI 47 GRIEP; 82: „Bln.“ SCHUMACHER (1913).
205. *Systellonotus triguttatus* (L.), selten, Männchen häufiger, am Boden auf Ödflächen, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäische Art.
Fundorte: 74: Chorin SCHUMACHER (1913), Geesow WAGNER (1941); 77: Prignitz JAAP, Schönberg VII 1877 KONOW; 79: Rüdersdorf SCHUMACHER (1913); 80: Lebus VI 69 GÖLLNER; 82: Baumschulenweg SCHUMACHER (1913), „Bln.“ SCHUMACHER (1913).
206. *Halioladopus rufescens* (BURM.), nur wenige Funde, unter *Calluna*, auch unter Graspolstern, auch in Meckl., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-sibirische Art.
Fundorte: 78: Paulinenaue VII 32; 81: Grunewald SCHUMACHER (1913), Pfaueninsel STICHEL (1926); 82: „Bln.“ BAERENSPRUNG/SCHUMACHER (1913).
207. *Harpocera thoracica* (FALL.), häufig, an blühenden Eichen, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-mediterrane Art.
Fundorte: 77: Prignitz JAAP, Triglitz WAGNER (1941); 78: Finkenkrug V 20 OLDENBERG/V 28, Lehnitz V 63 KNAUSS, Nd. Neuendorf V 47; 79: Buckow SCHIRMER & SCHUMACHER (1911), Freienwalde V 66 GÖLLNER, Frohnau STICHEL (1936); 80: Lebus V 32 LASS/VI 66 GÖLLNER; 81: Jünsdorf V 47, Mittenwalde V 65 u. 67 GÖLLNER, Pfaueninsel STICHEL (1926)/V 44 GRIEP, Potsdam VI 41 u. V 46 u. 47 GRIEP, Werder V 46 GRIEP, Templiner See VI 41 u. V 42 GRIEP; 82: „Bln.“ SCHIRMER & SCHUMACHER (1911).
208. *Macrotylus herrichi* REUT., selten, an *Salvia* auf trockenwarmen Böden, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-pontische Art.
Fundorte: 74: Brodowin VI 32, Chorin VI 32, Geesow WAGNER (1941); 79: Hönow VI 20 HÖHNE, Podelzig VI 67 GÖLLNER; 80: Lebus VI 67–69 GÖLLNER.
209. – *horvathi* REUT., nur wenige Funde, nach WAGNER im Süden, stellenweise häufig, an *Ballota nigra* L., auch in Anh. und Sa. gefunden. Europäische Art.
Fundorte: 75: Fürstenberg VIII 1877 KONOW; 80: Frankfurt VIII 32 SCHUKATSCHEK/MICHALK (1934); 81: Eiche VII 41 GRIEP.
210. – *paykulli* (FALL.), nicht selten, nach WAGNER verbreitet und häufig, an *Ononis*, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-mediterrane Art.
Fundorte: 74: Brodowin VII 08 DAHL (1912)/VI 32, Geesow WAGNER (1941); 77: Prignitz JAAP; 79: Hönow VI 20 HÖHNE, Mehrow V 33 LASS, Mühlenbeck VI 32, Schildow IX 32 SIEFKE; 80: Lebus VI u. VIII 68 u. VIII 69 GÖLLNER, Mescherin WAGNER (1941); 81: Glindow VIII 31/VII 38 u. 41–42 u. VI 43 GRIEP, Mittenwalde VI u. VII 67 GÖLLNER, Sperenberg V 30 LASS, Werder VII 41 GRIEP; 82: Baumschulenweg SCHUMACHER (1912), „Bln.“ BAERENSPRUNG, Friedrichsfelde VI 1886 BREDDIN.
211. – *solitarius* (M.-D.), nur ein alter Fund, nach WAGNER nicht selten und verbreitet, besonders auf *Stachys silvatica* L., auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. (selten) gefunden. Pontische Art.
Fundort: 82: „Bln.“ (BAERENSPRUNG) SCHUMACHER (1913).