

212. *Oncotylus punctipes* REUT., sehr selten, nach WAGNER nicht selten und weit verbreitet, an *Tanacetum vulgare* L., auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-sibirische Art.
Fundorte: 77: Prignitz JAAP; 78: Nauen VII 07 SCHUMACHER; 79: Hönöw VI 20 HÖHNE.
213. – *viridiflavus* (GZ.), nur ein alter Fund, an *Centaurea* sp., in den Nachbargebieten nicht gefunden. Europäisch-pontische Art.
Fundort: 82: „Bln.“ (Coll. BAERENSPRUNG) SCHUMACHER (1913).
214. *Plagiognathus arbustorum* (F.), häufig, an Kräutern (*Urtica*), oft an Ruderalstellen, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Paläarktische Art.
Fundorte: 74: Geesow WAGNER (1941); 75: Fürstenberg VII 1876 KONOW, Werbellinsee VIII 69 ECKERT; 77: Prignitz JAAP, Schönberg VI 1876 KONOW, Triglitz WAGNER (1939); 78: Finckenkrug VIII 19 HÖHNE/VII 28/VII 37 ZWICK, Lehnitz VII 60 KNAUSS; 79: Buckow SCHIRMER & SCHUMACHER (1911), H. Schönhausen VII 19 HÖHNE, Rüdersdorf VIII 68 GIESE, Schildow GREINER & SIEFKE (1933), Strausberg Torfhaus VIII 65 GÖLLNER, Summt VII 66 JAHN/VIII 71 GÖLLNER; 80: Gartz WAGNER (1941), Lebus VI 67 u. VIII 70 GÖLLNER, Reitwein VI 67 GÖLLNER; 81: Golm VII 41 u. VIII 42 GRIEP, Kl. Machnow VII 12 BOLLOW, Lichterfelde IX 52 V. KÉLER, Mittenwalde VII 67 GÖLLNER, Pfaueninsel STICHEL (1926), Potsdam VII 40 u. 41 u. 46 GRIEP, Sperenberg VII 30, Werder VII 41 GRIEP, Zehlendorf WAGNER; 82: „Bln.“ BAERENSPRUNG/TETENS/SCHUMACHER (1914), Grünau VIII 02 ENDERLEIN.
215. – *chrysanthemi* (WOLFF), häufig, an Kräutern, auf Wiesen und Ödflächen, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-sibirisch-mediterrane Art.
Fundorte: entsprechen denen von *arbustorum*.
216. – *albipennis* (FALL.), häufig, an *Artemisia* sp., auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Paläarktische Art.
Fundorte: 74: Chorin DAHL (1912), Geesow WAGNER (1941); 75: Fürstenberg V 1889 KONOW; 77: Prignitz JAAP, Triglitz WAGNER (1939); 79: Rüdersdorf VIII 68 GIESE, Podeliz VI 67 GÖLLNER, Schildow GREINER & SIEFKE (1933), Strausberg Torfhaus VII 65 GÖLLNER, Summt VII 66 JAHN; 80: Frankfurt IX 31 SCHUKATSCHEK, Gartz WAGNER (1941), Lebus VI u. VIII 67 u. VI–VIII 68 u. VIII 71 GÖLLNER, Mescherin WAGNER (1941), Reitwein VI 67 u. VIII 71 GÖLLNER; 81: Glindow VI 40 GRIEP, Hermannswerder VI 41 GRIEP, Mittenwalde IX 65 u. VII 67 GÖLLNER, Sperenberg X 30; 82: Baumschulenweg SCHUMACHER (1912), „Bln.“ BAERENSPRUNG/SCHUMACHER (1914), Friedrichsfelde IX 71 SCHULTZE, Friedrichshagen VII 65 GÖLLNER, Friedrichshain IX 62 JAESCHKE, Gosen IX 30, Frenzlauer Berg VI 71 HIEKE.
217. – *arenicola* WAGN., nicht selten, aber da erst 1941 beschrieben, Verbreitung nicht sicher, an *Artemisia campestris* L., auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäische Art.
Fundorte: 74: Geesow WAGNER (1941); 75: Eberswalde X 71 DIECKMANN; 79: Rüdersdorf VIII 27 UDE, Weißensee IX 71 HIEKE, Wuhden VIII 71 GÖLLNER; 80: Gartz WAGNER (1941), Lebus VIII 67 u. 71 GÖLLNER; 81: Mittenwalde IX 65 GÖLLNER; 82: „Bln.“ BAERENSPRUNG, Friedrichsfelde IX 71 SCHULTZE/X 71 HIEKE, Köpenick VII 65 SCHULZE.
218. – *collinus* WAGN., nur wenige Funde, ebenfalls erst 1941 beschrieben, nach WAGNER selten und besonders im Osten, an *Artemisia campestris* L., auch in Sa. gefunden. Europäische Art.
Fundorte: 74: Geesow WAGNER (1941); 79: Mühlenbeck IX 34, Rüdersdorf VII 19; 80: Gartz WAGNER (1941), Mescherin WAGNER (1941).
219. *Campylopus annulicornis* SIGN., nur wenige Funde an *Salix*-Arten, auch in Sa. gefunden. Europäische Art.
Fundorte: 80: Lebus VIII 71 GÖLLNER; 81: Werder VII 41 GRIEP, Wildpark VII 50 GRIEP.
220. *Campylopus verbasci* (M.-D.), häufig, auf *Verbascum* sp. und anderen niedrigen Pflanzen, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-mediterrane Art.
Fundorte: 74: Geesow WAGNER (1941); 77: Prignitz JAAP, Triglitz WAGNER (1939); 78: Oranienburg SCHUMACHER (1916); 79: Hennickendorf X 65 GÖLLNER, Rüdersdorf VIII 35 LASS, Summt VIII 71 GÖLLNER; 80: Gartz WAGNER (1941), Lebus VIII 68 u. VIII 70–71 GÖLLNER; 81: Bochow ZELETZKI & RINNHOFFER (1968), Bohnsdorf ZELETZKI & RINNHOFFER (1968), Bornim VIII 44 GRIEP, Mittenwalde VIII 66 u. 67 GÖLLNER, Sperenberg VII u. IX 30 LASS, Werder VI 43 GRIEP; 82: „Bln.“ BAERENSPRUNG/SCHUMACHER (1916), Friedrichshagen VII 65 GÖLLNER; 87: Plaue VIII 70 SCHUMMER.
221. *Monosynnum bohemani* (FALL.), nur wenige Funde, nach WAGNER verbreitet und nicht selten, an *Salix*-Arten, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Holarktische Art.
Fundorte: 77: Prignitz JAAP; 80: Frankfurt VII 31 u. VI 33 SCHUKATSCHEK, Lebus VIII 69 bis 70 GÖLLNER, Mescherin WAGNER (1941).
222. – *nigritula* ZETT., nur 1 Fundort, an *Salix*, auch in Meckl. und Sa. gefunden. Europäisch-sibirische Art.
Fundort: 79: Hönöw VIII 41.