

223. — *sabulicola* (WAGN.), nur zwei Fundorte, an schmalblättrigen *Salix*-Arten, besonders an Flußufnern, in den Nachbargebieten nicht nachgewiesen; bis jetzt nur zerstreute Funde. Europäische Art.
Fundorte: 80: Frankfurt VI 31 SCHUKATSCHKEK, Lebus VII 68 u. VIII 69 u. 71 GÖLLNER.
224. *Chlamydatus pulicarius* (FALL.), sehr häufig und verbreitet, auf trockenen Böden, unter Kräutern, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Holarktische Art.
Fundorte: ähnliche Fundorte wie *Stenodema*-Arten, jedoch etwas weniger weit verbreitet.
225. — *pullus* REUT., sehr häufig und verbreitet, auf trockenen Böden unter krautigen Pflanzen, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. verbreitet. Paläarktische Art.
Fundorte: etwas seltener als *pulicarius*, sonst ähnliche Verbreitung.
226. — *evanescens* BOH., nur ein Fund, auf trockenem Boden an Sedum-Arten, nur in Sa. nachgewiesen. Europäisch-sibirische Art.
Fundorte: 79: Buckow SCHIRMER & SCHUMACHER (1911).
227. — *saltitans* (FALL.), selten, auf trockenen Böden unter Kräutern (*Polygonum*, *Trifolium*), auch in Meckl., Thür. und Sa. nachgewiesen. Europäisch-sibirische Art.
Fundorte: 75: Fürstenberg X 1876 KONOW; 79: Herzfelde VI 31, Hönow IX 34 SIEFKE; 80: Lebus VI u. VIII 67 GÖLLNER; 81: Potsdam GRIEP; 82: Baumschulenweg SCHUMACHER (1912), „Bln.“ BAERENSPRUNG.
228. *Sthenarus rotermundi* (SCHOLTZ), selten, nach WAGNER stellenweise häufig, an *Populus alba* L., auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-maghrische Art.
Fundorte: 78: Finkenkrug SCHUMACHER (1917); 79: Mühlenbeck VII 33 SIEFKE; 81: Pfaueninsel VI 21 STICHEL/STICHEL (1926); 82: Baumschulenweg SCHUMACHER (1917), „Bln.“ SCHUMACHER (1913 u. 1917), Friedrichshain SCHUMACHER (1917).
229. — *modestus* (M.-D.), nur ein Nachweis, nach WAGNER nicht häufig, an Nadelhölzern, besonders *Pinus* sp., auch in Anh. und Thür. gefunden. Europäische Art.
Fundort: 79: Freienwalde VIII 00 ENDERLEIN.
230. — *roseri* (H. S.), nicht selten, nach WAGNER häufig und verbreitet, an Weide, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-sibirische Art.
Fundorte: 75: Fürstenberg VII 1890 KONOW; 77: Prignitz JAAP, Schönberg VII 1877 KONOW; 80: Lebus 30/VI 67–68 GÖLLNER, Mescherin WAGNER (1941); 81: Charlottenburg VII 1883 u. 1885 KONOW, Pfaueninsel VI 21 STICHEL, Potsdam VII 47 GRIEP, Werder VII 41 GRIEP, Wildpark VII 55 GRIEP; 82: „Bln.“ SCHUMACHER (1913 u. 1914).
231. *Riocoris crassicornis* (HAHN), nicht selten, an *Galium*, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-maghrische Art.
Fundorte: 74: Geesow WAGNER (1941); 77: Prignitz JAAP, Schönberg VII 1877 KONOW; 79: Schildow GREINER & SIEFKE (1933), Strausberg Torfhaus VIII 65 GÖLLNER; 80: Lebus VIII 67 u. VI–VII 68 GÖLLNER, Mescherin WAGNER (1941), Schiffmühle VII 69 GÖLLNER; 81: Mittenwalde VII 67 GÖLLNER, Potsdam VII 41 u. 42 GRIEP; 82: „Bln.“ SCHUMACHER (1914).
232. — *sulcicornis* (KB.), nur ein alter Fund, an *Galium verum* L., auch in Meckl., Anh. und Sa. gefunden. Europäisch-sibirische Art.
Fundort: 82: „Bln.“ BAERENSPRUNG.
233. *Atractotomus magnicornis* (FALL.), nur wenige Funde, nach WAGNER verbreitet und nicht selten, an Nadelhölzern, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäische Art.
Fundorte: 77: Prignitz JAAP, Triglitz WAGNER (1939); 79: H. Schönhausen VII 19 HÖHNE, Schildow GREINER & SIEFKE (1933); 81: Teltow VI 31.
234. — *mali* (M.-D.), nicht selten, an Obstbäumen, *Crataegus* und *Prunus*, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäische Art.
Fundorte: 77: Prignitz JAAP; 78: Hermsdorf VII 33, Lehnitz VI 63 KNAUSS; 79: Frohnau VII 33, Podelzig VI 67 GÖLLNER, Rüdersdorf VI 68 GIESE, Spechthausen ZELETZKI & RINNHOFER (1966); 81: Bochow ZELETZKI & RINNHOFER (1966), Bohnsdorf ZELETZKI & RINNHOFER (1966), Potsdam VII 42 u. 43, u. 46 u. VI 47 GRIEP, Sacrow VII 02 ENDERLEIN; 82: „Bln.“ BAERENSPRUNG, Friedrichshagen VII 65 GÖLLNER, Prenzlauer Berg VI 69.
235. *Psallus vitellinus* (SCHOLTZ), nur wenige Angaben, nach WAGNER nicht selten, besonders im Gebirge, an Nadelhölzern, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-sibirisch-mediterrane Art.
Fundorte: 77: Prignitz JAAP, Schönberg VII 1877 KONOW; 79: Hönow VII 30; 81: Teltow VI 31; 82: Potsdam VI 47 u. V 53 GRIEP.
236. — *ambiguus* (FALL.), nicht selten, nach WAGNER verbreitet und häufig, auf Laubhölzern, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäische Art.
Fundorte: 75: Eberswalde VI 65 DIECKMANN; 77: Prignitz JAAP, Triglitz WAGNER (1939); 79: Buchholz VI 70 SCHUMMER; 80: Reitwein VI 67 GÖLLNER; 81: Bochow ZELETZKI & RINNHOFER (1966), Bohnsdorf ZELETZKI & RINNHOFER (1966), Kl. Machnow VI 65 GRUEL,