

- Pfaueninsel VI 21 STICHEL, Zehlendorf VI 40; 82: „Bln.“ SCHIRMER & SCHUMACHER (1911)/SCHUMACHER (1913).
237. – *betuleti* (FALL.), selten, nach WAGNER weit verbreitet und nicht selten, auf Laubhölzern, besonders Birke, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. verbreitet. Europäisch-sibirisch-maghribische Art.
Fundorte: 77: Prignitz JAAP; 78: Finkenkrug VII 28, Kremmen VI 37 ZWICK; 79: Frohnau VI 32 STICHEL, Hönow V 25 PRIEFERT; 81: Potsdam VII 41 GRIEP; 82: „Bln.“ BAERENSPRUNG.
238. – *kolenatii* (FLOR), nur ein Fund, selten und zerstreut, nur im Norden, an Nadelhölzern, besonders Fichte, auch in Thür. und Sa. sehr selten. Boreo-montane Art.
Fundort: 78: Finkenkrug 02.
239. – *perrisi* MLS., nur ein Fund, früher jedoch nicht von *variabilis* getrennt, nach WAGNER verbreitet und häufig, an Eichen, auch in Meckl. und Sa. gefunden. Europäische Art.
Fundort: 81: Mittenwalde VI 67 GÖLLNER.
240. – *quercus* (KB.), nur eine Angabe, nach WAGNER verbreitet und nicht selten, an Eichen, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäische Art.
Fundort: „Brandenburg“ SCHUMACHER (1913).
241. – *variabilis* (FALL.), nicht selten, an Eichen, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. verbreitet. Europäisch-sibirisch-mediterrane Art.
Fundorte: 77: Prignitz JAAP, Schönberg VI 1876 KONOW, Triglitz WAGNER (1939); 78: Finkenkrug VI/VII 28; 79: Buckow SCHIRMER & SCHUMACHER (1911), Freienwalde V 66 GÖLLNER, Frohnau VI 33 STICHEL, Spechthausen ZELETZKI & RINNHOFFER (1966); 80: Lebus VI 68 u. 69 GÖLLNER, Schiffmühle VII 69 GÖLLNER; 81: Hermannswerder VI 41 GRIEP, Mittenwalde VI 66 u. 67 GÖLLNER, Pfaueninsel V–VI 21 STICHEL, Potsdam V 46 u. 47 u. 53 GRIEP/VI 66 u. 67; 82: „Bln.“ BAERENSPRUNG/SCHIRMER & SCHUMACHER (1911).
242. – *alni* F., nur wenige Funde, nach WAGNER verbreitet und häufig, an breitblättrigen Weiden, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäisch-sibirisch-maghribische Art.
Fundorte: 77: Prignitz JAAP; 80: Lebus VIII 67 u. 70 GÖLLNER, Mescherin WAGNER (1941); 81: Werder VII 41 GRIEP; 82: „Bln.“ BAERENSPRUNG.
243. – *alnicola* DGL. SC., nur ein Fund, nach WAGNER im Norden häufiger, an Erlen, auch in Meckl., Anh. und Sa. nachgewiesen. Europäische Art.
Fundort: 80: Lebus VI 69 GÖLLNER.
244. – *diminutus* (KB.), selten, nach WAGNER verbreitet und häufig, an Eiche, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. nachgewiesen, Europäisch-mediterrane Art.
Fundorte: 77: Prignitz JAAP; 78: Bredow VI 36 ZWICK, Finkenkrug VII 28; 79: Spechthausen ZELETZKI & RINNHOFFER (1966); 80: Frankfurt VI 31 SCHUKATSCHKEK, Lebus VI 68 GÖLLNER; 81: Mittenwalde VI 66 u. 67 GÖLLNER, Stahnsdorf VI 41 GRIEP; 82: „Bln.“ BAERENSPRUNG.
245. – *falleni* REUT., nur ein Fund, nach WAGNER verbreitet und nicht häufig, an Birke, auch in Meckl., Thür. und Sa. nachgewiesen. Europäische Art.
Fundort: „Brandenburg“ SCHUMACHER (1913).
246. – *flavellus* STICH., nur zwei Funde, nach WAGNER verbreitet und nicht selten, an Esche, in den Nachbargebieten nicht nachgewiesen. Europäische Art.
Fundorte: 80: Schiffmühle VII 69 GÖLLNER; 82: Rahnsdorf VI 1890 TETENS.
247. – *lepidus* FIEB., selten, nach WAGNER ziemlich häufig und verbreitet, an Esche, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. nachgewiesen. Europäische Art.
Fundorte: 77: Prignitz JAAP; 78: Bredow VI 36 ZWICK; 81: Golm VII 41 GRIEP, Potsdam VII 42 u. VI 43 GRIEP.
248. – *varians* (H. S.), nur zwei Funde, nach WAGNER verbreitet und häufig, an Laubhölzern (Eiche, Buche), auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. nachgewiesen. Europäische Art.
Fundorte: 79: Freienwalde V 66 GÖLLNER; 81: Stahnsdorf.
249. – *obscurus* (FALL.), nur wenige Funde, nach WAGNER verbreitet und häufig, an *Pinus* und *Juniperus*, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. nachgewiesen. Europäisch-maghribische Art.
Fundorte: 78: Finkenkrug VII 03 ENDERLEIN; 81: Mittenwalde VI 66 GÖLLNER, Wannsee VII 02 ENDERLEIN.
250. – *luridus* REUT., nur ein Fund, im Norden und im Gebirge häufiger, an *Larix*, auch in Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäische Art.
Fundort: 81: Potsdam VI 46 GRIEP.
251. – *salicellus* (M.-D.), selten, an Laubhölzern, besonders Hasel, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. nachgewiesen. Europäische Art.
Fundorte: 77: Schönberg VIII 1876 KONOW; 78: Landin HAUPT & HEDICKE (1937); 80: Frankfurt VIII 31 SCHUKATSCHKEK; 81: Zehlendorf 40.