

- 24(19) 头顶中央无纵沟, 触角第一节短于头的宽度: **顶加个眼**
- 25(28) 前翅前缘具显著的黑色边缘:
- 26(27) 小盾片中央无纵走条纹; 楔片顶角黑色, 触角第二节端部黑色, 胫节刺基部无黑色小点…………… 三点苜蓿盲蝽 *Adelphocoris fasciaticollis*
- 27(26) 小盾片中央基部具二条纵走条纹, 楔片顶端非黑色, 触角第二节一色, 胫节刺基部具黑色小点…………… 苜蓿盲蝽 *Adelphocoris lineolatus*
- 28(25) 前翅前缘无黑色边缘:
- 29(30) 前胸背板具两个黑色圆形斑点; 小盾片顶端黑色; 触角一色…………… 中黑苜蓿盲蝽 *Adelphocoris suturalis*
- 30(29) 前胸背板无黑色斑点, 或仅两腋微呈黑色; 小盾片顶端浅色; 触角第二节顶端黑色…………… 黑唇苜蓿盲蝽 *Adelphocoris nigritylus*
- 31(2) 爪垫退化, 仅成毛状, 爪基部内侧具齿 (图 1b)…………… 黑食蚜盲蝽 *Deraeocoris punctulatus*
- 32(1) 较小, 体长不及 4.0 毫米, 前胸背板前端无颌; 如具颌, 则头呈圆球形, 假爪垫显著 (图 1c):
- 33(40) 爪垫显著, 着生于两爪之间, 平行或顶端互相聚合 (图 1d):
- 34(35) 黑色种类, 身体粗圆; 头垂直, 强烈向下伸出; 后足股节粗大; 触角细长…………… 跳盲蝽 *Halticus minutus*
- 35(34) 浅色种类, 身体长形, 头不强伸出, 后足股节正常:
- 36(39) 前翅不透明, 头顶有隆起的后缘, 眼不与前胸背板前缘接触, 前胸背板胫显著, 胫节无黑色斑点, 胫节刺浅色:
- 37(38) 身体仅被一种简单的直毛, 头及触角黑色…………… 蒼翅盲蝽 *Cyrtorrhinus lividipennis*
- 38(37) 身体被扁平毛及简单直毛, 头及触角黄色…………… 杂毛盲蝽 *Melanorichus flavosparsus*
- 39(36) 前翅透明, 头顶无隆起的后缘, 眼与前胸背板前缘接触, 前胸背板胫不显著, 胫节具黑色斑点, 胫节刺黑色…………… 小透翅盲蝽 *Reuteriella annulicornis*
- 40(33) 爪垫退化或成毛状, 有时假爪垫显著:
- 41(42) 头圆球形, 前胸背板具颌, 假爪垫显著…………… 烟草盲蝽 *Cyrtopeltis tenuis*
- 42(41) 头不呈圆球形, 前胸背板无颌, 假爪垫不显著:
- 43(44) 黑色种类, 仅各足胫节浅色, 触角第二节短于头的宽度…………… 小黑盲蝽 *Chlamydatus pullus*
- 44(43) 浅色种类, 或仅触角及足黑色或具黑色斑纹:
- 45(48) 触角第二节短于头的宽度:
- 46(47) 触角第一及第二节黑色, 仅二者的关节处浅色…………… 异鬚盲蝽 *Campylomma diversicornis*
- 47(46) 触角第一及第二节浅色, 仅第一节中央环纹及第二节最基部黑色…………… 尼氏盲蝽 *Campylomma nicolasi*
- 48(45) 触角第二节长于或等于头的宽度:
- 49(52) 后足股节及胫节上有黑色斑点:
- 50(51) 前翅楔片内基角具一圆形黑色斑点, 触角非黑色, 喙第三及第四两节接合处粗大…………… 二点小盲蝽 *Camptotylus reuteri*
- 51(50) 前翅楔片上无黑色斑点, 触角黑色, 喙第三及第四两节接合处不粗大…………… 黑鬚盲蝽 *Plagiognathus nigricornis*
- 52(49) 后足股节及胫节上无黑色斑点:
- 53(54) 体小, 长 2 毫米, 绿色; 触角第二节的长度约等于头的宽度…………… 一色小盲蝽 *Tuonia unicolor*
- 54(53) 体较大, 长 3 毫米, 黄色; 触角第二节长于头的宽度…………… 红荆盲蝽 *Tuonia tamaricicola*

1. 赤鬚盲蝽 *Trigonotylus ruficornis* Geoffroy

长形, 体长 4.5—6.0 毫米, 雌虫大于雄虫, 浅黄绿色, 光秃无毛, 触角及足具短毛。头长三角形, 前端尖锐, 头顶中央具深纵沟; 触角红色。前胸背板无颌, 仅具凹痕。

寄生于禾本科作物及杂草间, 为害小麦、粟、玉米和苜蓿等, 在棉田内数量很少; 以卵越冬。广泛分布于全北区各地, 我国北方各省均有发现。在云南西双版纳亦采到。

2. 透翅盲蝽 *Hyalopeplus* sp.

长 7.5 毫米, 黄色, 具黑红色斑纹。前胸背板具刻点, 前翅透明, 后足胫节密生长毛。本种与 *H. pellucidus* Stal 相似, 但前胸背板与小盾片构造不同, 可能是一个新种, 因手下标本残缺不全, 暂不命名。