

直,寬于前胸背板前緣,头頂后緣不具隆起邊緣;自側面观察,唇基稍突出。触角具黑色环紋,第二節約等于头的寬度。喙及于中足基节。前翅半透明。股节及脛节具黑色斑点,后足股节粗大,跗节第二节与第三節約等长;爪垫显著,頂端相向聚合。

根据爪垫的构造,本属应属合垫盲蝽亚科 *Orthotylinae*, 与 *Melanotrichus* Reuter 接近,但身体較寬,头寬短,触角較粗而短,前翅半透明。

属模: *Reuteriola annulicornis*, 新种

### 21. 烟草盲蝽 *Cyrtopeltis tenuis* Reuter

长 3.5—3.8 毫米,寬 1.1—1.15 毫米。黃綠色,被黃色細毛。头中叶、小盾片頂端、革片頂端中央、楔片頂端、膜片、翅脉、触角第一节中部与第二节基部及頂端、喙頂端、脛节最基部、跗节頂端黑色。头自背面观察圓形,眼位于兩側中央,与前胸背板前緣远离。前翅半透明。

广泛分布全国,为害烟草和芝麻等。在棉花和芝麻混作的棉田里,棉花上常有发现。

### 22. 小黑盲蝽 *Chlamydatus pullus* Reuter

橢圓形,长 2.25—2.5 毫米,寬 0.95—1.0 毫米。黑色,光亮,具稀疏的黑色細毛。各足股节頂端、脛节及第一第二跗节黃色。头寬,触角短,第二节短于头的寬度;脛节刺黑色,其着生处具显著的黑色斑点。

广泛分布于古北区,寄生于山柳菊、岩高兰等属植物。在我国采集于吉林公主岭、北京、陝西关中、河南安阳及甘肃各处的草莓、苜蓿和棉田中。以卵在苜蓿的組織內越冬,春季在苜蓿地里数量很大,靠近苜蓿地的棉花上也很多,但为害不重。

### 23. 异鬚盲蝽 *Campylomma diversicornis* Reuter

橢圓形,长 2.45—2.6 毫米,寬 1.0—1.05 毫米。黃綠色,被灰色細毛。触角第一及第二节、喙頂端、后足股节上的許多斑点、脛节刺及其着生处的斑点黑色。头垂直,寬短;触角短,第二节短于头的寬度。

国外分布于中央亞細亞。国内分布很广,采于河北(天津)、河南(安阳)、陝西、新疆(阿克苏)、四川(峨眉山、西昌)等地。

寄生于棉花、榆树、枣树、木槿和一些菊科植物上。

### 24. 尼氏盲蝽 *Campylomma nicolasi* Puton et Reuter

与前种极相似,但触角第一、二节浅色,仅第一节中央及第二节基部黑色。

国外分布于欧洲南部与非洲北部。国内分布于河南(安阳)、江西(新余、蓮塘)、湖北(武昌)、四川(西昌)、云南(西双版纳)等地。采于芝麻与棉田中,也寄生于木槿和一些菊科植物上。

### 25. 二点小盲蝽 *Camptotylus reuteri* Jak.

长 2.3 毫米,寬 0.9 毫米。不均匀的黃綠色或深綠色,体毛白色,在一定光照方向下呈黑色。黄色个体的革片的基部及中央、爪片的和楔片的基部常呈白色。后足股节背面密布黑色斑点,脛节刺黑色,其着生处具黑色斑点。头寬,自背面观察前方凸圓。触角細长,第二节长于前胸背板基部的寬度。楔片近內基角处有一个显著的黑圓形斑点。

国外分布于欧洲南部。在我国采集于山东惠民和河北天津。主要寄生于紅荊上,靠近紅荊的棉花上数量也很多,但为害很輕。