

К роду относятся 2 вида: *L. nigritarsis* (Jak., 1881, comb. nov., и *L. albipennis* (Reut., 1876), comb. nov. (= *Atractotomus albipennis* Reut., 1876, sec. spec. typ ♀ = *Criocoris fuscipennis* Jak., 1882, syn. nov., sec. spec. typ ♂). Оба вида распространены в восточной части Палеарктики и живут на степных бобовых: *L. nigritarsis* на *Caragana frutex*, *L. albipennis* — на *Astragalus*.

Род **STHENARUS** Fieb., 1858, sensu lato

Род *Sthenarus* sensu lato был недавно подвергнут обстоятельной ревизии Вагнером (1958). Основываясь на сходстве малозначительных морфологических признаков и недооценивая принципиальные различия в строении гениталий ♂, Вагнер сохранил *Sthenarus* как единый род с 2 подродами. С этим однако невозможно согласиться. Виды *Sthenarus* из европейской части СССР относятся к 5 различным группам.



Рис. 44—60.

44, 47—50 — *Atractotomus magnicornis* Fall. (44 — коготок, 47 — правый парамер, 48 — левый парамер, 49 — тека, 50 — эдеагус); 46, 51—55. *Leguminola nigritarsis* Jak. (46 — коготок, 51 — правый парамер, 52 — левый парамер, вид сбоку, 53 — левый парамер, вид сверху, 54 — тека, 55 — эдеагус); 45, 56—60 — *Heteroscapillus tigripes* Muls. (45 — коготок, 56 — правый парамер, 57 — левый парамер, вид сбоку, 58 — левый парамер, вид сверху, 59 — тека, 60 — эдеагус).

1. Род **STHENARUS** Fieb., 1858

Тип рода: *Sthenarus rotermundi* (Scholtz, 1846). 2 вида: *S. rotermundi* (Европа, на тополе) и *S. albipilis* E. Wagn. (Марокко). Род явно близок к роду *Psallus* Fieb.

Сравнительно крупные, округлые, светло окрашенные виды, сверху густо покрыты белыми чешуйками и волосками, на кунеусе и краях надкрыльев имеются черные во-