

К подроду относятся 3 вида, ранее включавшихся в *Sthenarus*: *P. (A.) ocellaris* (Muls., 1852), comb. nov. (= *maculipes* Reut.), *P. (A.) dichrous* nom. nov. [= *P. wagneri* (Carv., 1955), comb. nov., nom. praec. (nec Oss., 1953)] и *P. (A.) flavipes* (Reut, 1899), comb. nov. Все виды живут в Средиземноморье на *Quercus* spp. Новый подрод характеризуется мелкими размерами, одноцветными темными надкрыльями, широкой головой



Рис. 61—79.

61, 62 — *Sthenarus rotermundi* Scholtz (уменьшено вдвое по сравнению с другими рисунками) (61 — эдеагус, 62 — левый парамер, вид сверху); 63 — *Psallus (Asthenarius) ocellaris* Muls., эдеагус; 64—67 — *Salicarus roseri* H.-S. (64 — правый парамер, 65 — левый парамер, 66 — тека, 67 — эдеагус); 68—71 — «*Sthenarus*» *dissimilis* Reut. (68 — правый парамер, 69 — левый парамер, 70 — тека, 71 — эдеагус); 72—75 — *Phoenicocoris obscurellus* Fall. (72 — правый парамер, 73 — левый парамер, 74 — тека, 75 — эдеагус); 76—79 — *Ph. modestus* Mey.-D. (76 — правый парамер, 77 — левый парамер, 78 — тека, 79 — эдеагус).

с слегка заостренным задним краем темени, слабее сужающейся кпереди переднеспинкой и строением эдеагуса. В то же время строение генитального сегмента и эдеагуса убедительно свидетельствует в пользу принадлежности к роду *Psallus*. Интересно, что *P. (Hyllopsallus) quercus* Kbm. имеет строение эдеагуса и парамеров весьма сходное с подродом *Asthenarius*.

##### 5. «*Sthenarus*» *dissimilis* Reut., 1878

Систематическое положение этого вида остается неясным. Гениталии ♂ изображены на рис. 68—71. Они обнаруживают заметное сходство с таковыми в роде *Atractotomus*, но эдеагус сильнее закручен (как у *Phoenicocoris* или *Salicarus*), вершинный отросток его длиннее и сильно склеро-