



Рис. 45—51. *Lygocoris (Arbolygus) fulvus* Jak.

45 — левый парамер с наружной стороны, 46 — правый парамер с внутренней стороны, 47 — его гипофиз сверху, 48 — вершина теки, 49 — эдеагус в расправленном виде, 50, 51 — то же, при максимальном расправлении (схематично).

*Lygocoris (Arbolygus) ulmi* Kerzhner, sp. n. (рис. 52—57)

*Adelphocoris flaviventris* (non Reut.): Lindberg, 1934: 14, fig. 2.

Основная окраска черная или темно-бурая, с более или менее развитым светлым, желтовато-белым рисунком. Голова обычно светлая с бурым расплывчатым рисунком на лбу и темени, реже целиком светлая или целиком бурая. 1-й и базальная часть или кольцо на 2-м членике усиков нередко светлые, основание 3-го и иногда 4-го члеников узко светлое. Хоботок светлый с черной вершиной. Шейное кольцо и узкая полоска по заднему краю переднеспинки всегда светлые, обычно имеется 2 светлых пятна за шейным кольцом, а чаще всего еще и 1—2 светлых пятна или продольные полоски у ее передних углов. Задняя доля переднеспинки лишь крайне редко слегка светлее посредине у заднего края. Вершина и боковые углы щитка светлые, реже боковые углы темные или весь боковой край светлый. Надкрылья обычно не-