

Ширина головы у ♂ 96—100, у ♀ 93—103; ширина темени у ♂ 30—33, у ♀ 36—39; длина члеников усиков начиная с 1-го: 46, 150 у ♂ и 120—130 у ♀, 65, 45; ширина переднеспинки у ♂ 165—175, у ♀ 175—200.

Гениталии ♂ как на рис. 74—79.

Длина тела 5.4—6.2, ширина 2.1—2.3 мм.

Материал. СССР. Сахалин: подножье горы Чехова, на зимовке под корой березы, 27 III 1970 (Купоросов), 3 ♂, в том числе голотип, 3 ♀; поселок Заветы Ильича, Невельский р-н, 26 VII 1970 (Куликов), 1 ♂; Правда, 12 км Ю Холмска, 15 VII 1968, 26 VII 1971 (Нарчук), 7 ♀; Сокол, 14 V 1971 (Жильцова), 1 ♀; р. Лесная, 14 V 1974 (Жильцова), 1 ♀; Невельск, 27 V 1968 (Нарчук), 1 ♀; Новоалександровск, 11 VII 1968 (Нарчук), 1 ♂; там же, 15 V 1973 (Ермоленко), 1 ♀. Кунашир: Южно-Курильск, 30 VI 1976 (Ануфриев), 1 ♀; Серноводск, 6 VI 1973 (Кержнер), 1 ♀; вулкан Головнина, 24 VII 1973 (Кержнер), 1 ♂, 2 ♀; Третьяково, 3 VIII 1973 (Кержнер), 2 ♀; Алексино, 29 VII 1973 (Кержнер), 16 экз. Шикотан: Малокурильск, 21 VIII 1973 (Кержнер), 1 ♂; Крабозаводск — бухта Церковная, 15, 17 VIII 1973 (Кержнер), 2 ♀; бухта Церковная, 16 VIII 1973 (Кержнер), 1 ♀. Итуруп: Курильск, 22 VIII 1973 (Кержнер), 1 ♀; р. Осенняя, 18 VIII 1976 (Данилович), 5 ♂, 3 ♀.

Живет на *Salix udensis* Trautv. et Mey. (= *sachalinensis* F. Schmidt).

Совместные находки *S. duplicatus* и *S. distinguendus* в Сычуани и на Сахалине хорошо подтверждают видовой статус этих таксонов.

Для определения видов и подвидов рода *Salignus* может служить приведенная ниже определительная таблица:

- 1(2). Мельче (длина тела 4.4—5.1 мм). Генитальный сегмент у края отверстия, с левой стороны без бугорка. Гипофиз левого парамера перед вершиной с едва намеченным зубчиком. Гениталии ♂ как на рис. 64—69. СССР от Алтая (Кош-Агач) до Приморского края и Сахалина (Новоалександровск), на север до Якутии и Магаданской обл. Сев. Монголия, Китай (Сычуань). Указан также для Сев. Америки. На *Salix* *S. distinguendus* Reut.
2(1). Крупнее (5.4—7.5 мм). Генитальный сегмент у края отверстия, с левой стороны со светлым бугорком. Гипофиз левого парамера с хорошо развитым направленным назад зубчиком. Гениталии ♂ как на рис. 70—79.
3(4). Длина тела 7—7.5 мм (известны только ♂). Юго-Вост. Китай (Сычуань, Ганьсу) *S. duplicatus* *duplicatus* Reut.
4(3). Длина тела 5.4—6.2 мм. Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп *S. duplicatus* *medius* subsp. n.

Teratocoris depressus Kerzhner, sp. n. (рис. 80—83)

Ярко-зеленый. Вершина 1-го членика усиков иногда желтоватая, 2-й членник усиков рыжевато-желтый, темнеющий к вершине, 3-й и 4-й — темно-бурые. Лапки желтые, вершинная половина 3-го членика темная. Хоботок желтый, вершина последнего членика черная.

Все тело плоское, голое. Голова 5-угольная, боковые края ее от глаз до основания усиков параллельные или расходящиеся кпереди, лоб треугольный, нависающий над наличником, на вершине узко округлен. Ширина головы равна или слегка (не более чем в 1.2 раза) больше длины. Глаза очень маленькие, в 4—4.5 раза уже темени. Темя с продольной бороздкой, заходящей за уровень переднего края глаз, без попечного вдавления. Усики очень длинные, 1-й членник длиннее головы, переднеспинки и щитка вместе взятых; 2-й и 3-й чле-