

Sã o N i c o l a u: Ribeira Brava, 8. XII., 2 Exx. — Sã o T i a g o: Praia, 14. II., 1 Ex. — B r a v a: Vila de Nova Cintra. 22. II., 1 Ex., 5. III., 1 Ex.

Ganz vereinzelt von Sträuchern geklopft, auch unter Laub. — 5 Exx.

Nach CARAYON ein in Afrika einschliesslich Madagaskar und den Maskarenen häufiges tropisches Kosmopolit.

C. pygmaeus Popp. ssp. **pauliani** Lansb. (Carayon det.)

Cardiastethus pygmaeus Popp. Acta Soc. Scient. Fenn. 37, 9, 1914: — *C. pauliani* Lansb. Ent. Mag. 1079, 90, 1954: 90. — Carayon, Ann. Soc. Ent. Fr. 126, 1957: 167.

Sã o V i c e n t e: Ribeira Julião, 9. III., 1 Ex.

Eine in Afrika (südlich der Sahara) weit verbreitete Art.

Buchananiella Reut.

B. sodalis (Buch.-White) (Carayon det.)

Cardiastethus sodalis Buch.-White 1878. — *Poronotellus* s. Carayon, Bull. Mus. Paris, 2. ser. XXVIII, 1, 1956: 103.

Sã o N i c o l a u: Ribeira Brava, 6.—7. XII., 3 Exx. — Sã o T i a g o: Ribeira da Boa entrada, 9. II., 1 Ex. — B r a v a: Vila de Nova Cintra, 1. II., 1 Ex.

Die Art ist von Hawaii beschrieben, hat sich als eine im tropischen Afrika weit verbreitete Art erwiesen und wird von CARAYON als tropischer Kosmopolit bezeichnet.

MIRIDAE

Deraeocorinae

Deraeocoris Kirschb.

D. nigropunctatus n. sp. (Abb. 27 a—d, 28)

Grundfarbe der Oberseite gelbbraun mit sehr schwachem olivgrünem Anflug. Schwarze Zeichnungen, schwarz punktiert, weiss behaart.

Kopf glänzend schwarz, im hinteren Teil des Scheitels ein Querstrich und in der Mediane der Stirn und des Clypeus ein Medianstreifen gelblich. Antennen schwarz, mit kurzen feinen weissen anliegenden Härchen sowie einigen langen halb aufrechtstehenden Haaren. Die Antennenglieder verhalten sich wie die Zahlen: 1, 3, 1.2, 1. 1. Glied die Spitze des Kopfes überragend, 2. Glied $\frac{3}{4}$ so lang wie das Pronotum am Hinterrande breit. Pronotum mit geraden Seiten und schwach ausgebuchtetem Hinterrand. Halsring des Pronotums gelb, matt, unpunktiert. Vorderteil des Pronotums einschliesslich einer kallösen queren Erhebung glänzend schwarz, unpunktiert, Hinterteil ziemlich grob punktiert.

Schildchen am Vorderrande schwarz, sonst gelb mit wenigen schwarzen Punkten. Vorderflügel fein schwarz gerandet, Hinterecken des Coriums braunschwarz, am Hinterrande ausserdem eine schwärzliche Schattierung. Clavusspitze ange-dunkelt. Cuneus noch spärlicher punktiert als Corium und Clavus, im vorderen Teil weisslich, durchsichtig, hinten mit schwarzem Dreieck. Membrannerven schwarz-grau, vorderer Teil der Membran weisslich, hinterer rauchfarben.

Beine mit weissen längeren und kürzeren Haaren. Schenkel dunkel kleingefleckt, Hinterschenkel im Spitzenteil angedunkelt, Schiene weisslichgelb mit schwarzem breitem Ring in der Mitte. Tarsen dunkel.