

Abb. 28. *Deraeocoris nigropunctatus* n. sp.



Abb. 29. *Megacoelum scutellare* Popp.

Chã da Preguisa, 13.—17. XII., 1 Ex. — S a l: Terra Boa, 21. I., 2 Exx.; Pedra da Lume, 19. I., 1 Ex.

Die Art liegt nur in 5 vereinzelten Exemplaren — von trockenen steppen- und wüstenartigen Standorten — vor. Ein Exemplar wurde auf Chã da Preguisa auf der Leguminose *Indigofera tinctoria* gesammelt. Auch von den Kanaren von ariden Standorten vorliegend. Möglicherweise beruht die knappe Repräsentation der Art in meinem Material darauf, dass die Art später als andere Miriden, d.h. zu einer Zeit, als ich die Inselgruppen nicht besucht habe, als Imago auftritt. — Die Art hat die Farbe trockener Steppengräser.

Südlichste Teile der südeuropäischen Halbinseln; Madeira, Kanaren, Marokko, Algerien, Tunisien, Ägypten, Zypern, Sudan, Abessinien, Arabien. Eine eremische Art, die bis in die mediterrane Subregion verbreitet ist.

Megacoelum Fieb.

M. scutellare Popp. (Abb. 29; 30 a—d)

Megacoelum scutellare Popp. Mirid. Äthiop. Reg. I, 1912: 34.

S a n t o A n t ã o: Campo da Cão, 30. XII., 2 Exx.; Ribeira Grande, 28. XII., 1 Ex. — S ã o V i c e n t e: Ribeira Julião, 26.—28. XI., 2 Exx., 10. III., 1 Ex. — S ã o N i c o l a u: IX. 1898 (L. Fea, nach Poppius); Ribeira Brava, 6.—7. XII., 7 Exx.; Ribeira do Recanto, 12. XII., 3 Exx.; Chã da Preguisa, 14. XII., 3 Ex. —