



Abb. 36. *Lygus acaciae* n. sp. a Genitalsegment des ♂, b rechter Paramer, c linker Paramer, d Aedeagus und Theca.

Beim ♂ sind 2. und 3. Glied der Antennen deutlich dicker als beim ♀. 2. Glied so lang wie der Hinterrand des Pronotums. Beim ♀ ist das 2. Glied um $\frac{1}{7}$ kürzer als der Pronotum-Hinterrand. Spitzenteil des 2. Gliedes (etwa $\frac{1}{4}$ der Länge des Gliedes) schwarz. Auch die Spitze des 3. Antennengliedes angedunkelt. Spitze des Clypeus schwarz. Spitzenhälfte des 4. Gliedes des bis zu den Mittelhüften reichenden Rostrums schwarz. Scheitel hinten in der ganzen Breite gerandet.

Pronotum, Corium und Clavus mit feinen gekrümmten hellen Haaren. Bei mehreren ♀♀ ein roter Medianstreifen auf dem Schildchen sowie rötliche undeutliche Fleckchen auf Pronotum, Kopf und Antennen. Beim ♂ haben Pronotum und hinterer Teil des Coriums einen grünen Anflug. Die Membranadern sind grün. Beim ♀ sind die Deckflügel wie die Membranadern gelblich. Cuneusspitze nicht angedunkelt.

Unterseite einfarbig gelb. Beine hellgelblich, fein hellbehaart, Schiene mit schwarzen Borsten. Schenkel, besonders Hinterschenkel rotgesprenkelt, 3. Tarsenglied angedunkelt. 2. und 3. Tarsenglied gleich lang, 1. kürzer.

Genitalsegment des ♂ sowie Parameren und Penis sind abgebildet (Abb. 36 a—d).

Länge: ♂ 3,8, ♀ 4,3 mm

Holotype ♂ (Nr. 11096), *Allotype* ♀ (Nr. 11097).

São Tiago: Serra do Pico da Antonia, 10. II., 18 Exx. — Fogo: supra Fonte Aleixo, 19. II., 1 Ex.

Im zentralen Berggebiet auf São Tiago wurde die Art (in etwa 1 000 m) an der auf dieser Insel einheimischen *Faidherbia albida* angetroffen.

Endemisch.

***L. flavoseutellatus* n. sp. (Abb. 37; 39 a—c)**

Die Oberseite dieser charakteristischen, verhältnismässig kleinen *Lygus*-Art ist rötlich- oder gelblichbraun, Schildchen lebhaft gelb, Clavus, besonders beim ♂, angedunkelt, Cuneusspitze schwarz.

Augen gross, schwarz, beim ♂ ist der Scheitel am Hinterrande zwischen den Augen halb so breit wie ein Auge, beim ♀ ist er so breit wie das Auge. Scheitel hinten gerandet. Antennen gelb, Spitzendrittel des 2. Gliedes schwarz, 2. Glied beim ♂ etwa so lang wie das Pronotum am Hinterrande breit, beim ♀ etwas kürzer. Clypeus und Wange schwarz; bei dunkleren ♂♂ ist der Kopf ganz dunkel. Die Spitze des Rostrums erreicht die Mittelhüften, Spitzenhälfte des 4. Gliedes schwarz.