

Pronotum ziemlich abgeflacht, bei dem kurzgeflügelten ♀ am Hinterrande fast doppelt so breit wie in der Mediane lang; hier so lang wie der Kopf. Die Seiten des Pronotums sehr wenig eingebuchtet. Der Halsring nur an den Seiten deutlich abgesetzt. Schildchen flach. Deckflügel durchsichtig, einfarbig weisslichgelb, flach und weitläufig punktiert, länglich oval, etwa 3mal so lang wie breit, nicht die Hinterleibspitze erreichend.

Beine ziemlich lang, die drei Tarsenglieder von gleicher Länge, Hinterschiene mit hellen Dornen, die so lang sind wie die Schiene dick. Klauen ohne deutliche Arolien.

Typus generis *E. graminum* n. sp.

E. graminum n. sp. (Abb. 47 c)

Kopf und Pronotum dunkel rostbraun-schwarz, Schildchen rostbraun mit gelblicher Medianlinie. Antennen, Deckflügel, Hinterleibsrücken, Unterseite und




Abb. 47. *Allodapus longicornis* Reut. macropteres Ex. (a). brachypteres Ex. (b).
— *Eremachus graminum* n. gen., n. sp. (c).

Beine hellgelb. 1. Antennenglied in der Mitte ein wenig dicker als an der Basis und an der Spitze. Kopf gekörnelt, Augenbreite $\frac{1}{3}$ der Breite des Scheitels (♀). Pronotum im vorderen Teil gekörnelt-punktiert, im hinteren Teil wie Schildchen quergerichtet. Der abgeflachte Halsring in der Mediane halb so lang wie der übrige Teil des Pronotums. Hinterrand des Pronotums flach eingebuchtet.

Länge: 2.5 mm.

Holotype ♀ (Nr. 11108).