



Abb. 52. *Psallus artemisiae* n. sp. a Aedeagus, b rechter Paramer, c, d linker Paramer. — *P. odontospermi* n. sp. e, f linker Paramer, g rechter Paramer. — *P. nicolauensis* n. sp. h Aedeagus, i rechter Paramer, k, l linker Paramer.

*P. (Stigmocorista) nicolauensis* n. sp. (Abb. 50 b; 51 d, h; 52 h—l)

Diese auf den höchsten Bergen von São Nicolau gefundene Art ist die dunkelste unter den Arten der Untergattung.

Kopf ganz schwarz oder im hinteren Teil des Scheitels schwarzgrau. 1. Antennenglied mit Ausnahme der Spitze schwarz, 2. Glied an Basis und Spitze angedunkelt.

Auf der Oberseite überwiegt die dunkle Zeichnung. Zwischen stärker dunklen fleckenartigen Stellen kann man etwas hellere unterscheiden. Cuneus meist dunkler als der übrige Teil des Deckflügels. Membran dunkel rauchfarben, hinter der kleinen Zelle eine etwas hellere Stelle. Unterseite schwärzlich. Hüften, Basen der Schenkel sowie Schienen hell. Vorder- und Mittelschenkel im Spitzenteil angedunkelt, Hinterschenkel grösstenteils schwarz. Auf dem schwarzen Grunde der letztgenannten treten die dunklen Punkte an der Basis der Dornen kaum hervor. Punkte an den Basen der Schienendorne verhältnismässig gross. Spitze des 3. Tarsengliedes deutlich angedunkelt.

Die männlichen Genitalien ähneln sehr denen der anderen Arten der Untergat-