

zu der von WAGNER erst im J. 1949 beschriebenen Art *maritimus* gehört. — *L. maritimus* kommt an Meeresufern im westlichen Teile von Süd- und Mitteleuropa vor.

#### Taylorilygus Kelt.

##### *T. apicalis* Fieb.

*Lygus apicalis* Fieb. Eur. Hem. (1861): 275. Lindb. 1941: 15. — 1953: 117. — *Taylorilygus a.* Lindb. 1958: 92.

M a d e i r a: Serra de Agua, 16—19. VII. 1957, 1 Ex.; São Vicente, 1—2. VII. 1957, 1 Ex.

Diese im Mittelmeergebiet sowie in der äthiopischen Region und — eingeschleppt — in weiten Teilen anderer wärmerer Regionen vorkommende Art ist nicht früher vom Madeira-Archipel angeführt. — Azoren, Kanaren, Kapverden.

#### Orthops Fieb.

##### *O. conspurcatus* Reut.

*Lygus conspurcatus* Reut. Gen. Cim. (1875): 18. — China 1938: 31. — Lindb. 1941: 30. — 1953: 118.

M a d e i r a: Noualhier; Serra de Agua, 16—19. VII. 1957, 1 Ex.; Funchal, 1 Ex. (Storå).

Ganz vereinzelt. Auf Tenerife ist beobachtet worden, dass die Art auf angepflanzten Bäumen im Kulturbereich vorkommt. Westmediterrane Art.

##### *O. Kalmi* (L.)

*Cimex Kalmi* L. Syst. Nat. 10 (1758): 448. — *Lygus k.* China 1938: 32.

M a d e i r a: 1 Ex. (coll. Wollaston), Noualhier; Punta de Pargo, 5. VII. 1957, 1 Ex. — Serra de Agua, 16—19. VII. 1957, 7 Exx.; São Vicente, 1—2. VII. 1957, 1 Ex.; Formosa pr Funchal, 28. IV. 1959, 1 Ex.; Funchal, 6 Exx. (Frey); Porto Novo, 1 Ex. (Frey).

Die Art lebt auf Umbelliferen. Auf Kulturboden an Ruderat-Vegetation. Eurosibirische Art die sich südwärts in der mediterranen Subregion verbreitet hat. Weder auf den Azoren noch auf den Kanaren.

##### *O. insularis* Reut.

*Lygus insularis* Reut. Rev. d'Ent. (1885): 137. — China 1938: 32. — Lindb. 1941: 15. — 1953: 118.

M a d e i r a: 4 Exx. (coll. Wollaston) 1 Ex. (leg. Schmitz, in Mus. Helv. Type No 3619); Porto Moniz, 4. VII. 1957, 4 Exx.; Punta de Pargo, 5. VII. 1957, 1 Ex.; Fonte do Barro, 4. VII. 1957, 8 Exx.; Serra de Agua, 16—19. VII. 1957, 6 Exx.; Queimadas, 24—26. VI. 1957, 20 Exx.; Pico Ruivo, 27—29. VI. 1957, 12 Exx.; Porto da Cruz, 9. V. 1959, 1 Ex.; Funchal, São Roche, 15. III. 1953, 1 Ex. (MF).

Auf *Laurus canariensis* und anderen Laurazeen und somit hauptsächlich im Nordteil von Madeira vorkommend. Ein Charaktertier der Lorbeerwälder, das im Sommer auftritt. Während meines Besuches im Frühjahr 1957 fand ich nur ein Exemplar, im Sommer ist sie häufig. Auf den Azoren und auf vier von den Kanarischen Inseln.