

**Eurystylus Stål****E. occidentalis E. Wagn.**

*Eurystylus occidentalis* E. Wagn. Comm. Biol. XIV, 2 (1953): 8. — Lindb. 1953: 117. — 1958: 99.

Porto Santo: Baleira, 6—12. VII. 1957, 2 Exx.

Auf dem Sandufer auf der SW-Seite von Porto Santo, auf Halophyten, wahrscheinlich *Zygophyllum Fontanesii*. Bisher ist die Art nur von den Kanarischen und Kapverdischen Inseln angeführt, wahrscheinlich hat sie aber eine weitere Verbreitung in eremischen Gebieten, an Küsten NW-Afrikas und im westlichen Teil des Mittelmeergebietes.

**Deraeocoris Kbm.****D. punctum (Rmb.)**

*Phytocoris punctum* Rmb. Faun. Andal. (1842): 164. — *Deraeocoris p.* Osh. Verz. Pal. Hemipt. I, 3 (1909): 751.

Madeira: Rabaçal, 3—4. VII. 1957, 1 Ex.; Terreira da Luta, 21. VII. 1957, 12 Exx.; Monte, 12. VI. 1957, 1 Ex.; Funchal, 9—10. VI. 1957, 3 Exx.

Der roten Form (Hauptform) gehören 5 Exemplare an, die übrigen 12 der schwarzen, (f. *nigerrimus* Put.).

*D. punctum* liegt von der Kulturzone der Insel Madeira vor. — Sie kommt vor allem in westlichen Teil des Mittelmeergebietes — Portugal, Spanien, Italien, Sardinien, Sicilien, Marokko Algerien, Tunesien — vor, ist auch vom Kleinasien angegeben. Sie ist nicht von anderen makaronesischen Inseln als Madeira angeführt. — OSHANIN führt sie in seinem Verzeichnis von Madeira an.

**Camptobrochis Fieb.****C. serenus Dgl. Sc.**

*Camptobrochis serenus* Dgl. Sc, Ent. Montl. Mag. 5 (1868): 135. — *C. punctulatus* var. *serenus* China 1938: 32. — *C. serenus* Lindb. 1953: 121.

Madeira: 1 Ex. (coll. Wollaston) Mediterrane Art. Auf den Kanarischen Inseln ist sie häufig.

**Stenodema Lap.****S. laevigatum (L.)**

*Cimex laevigatus* L. Syst. Nat. 10 (1758): 449. — *Stenodema l.* China 1938: 32.

Madeira: 6 Exx. (coll. Wollaston); Fonte de Barro, 4. VII. 1957, 1 Ex.; Rabaçal, 3 Exx. (Lu); Serra de Agua, 16—19. VII. 1957, 19 Exx.; Rosario, 2. VII. 1957, 1 Ex.; Queimadas, 24—26. VI. 1957, 1 Ex.; Pico Ruivo, 27—29. VI. 1 Ex.; Ribeira Frio, 15. VI. 1957, 2 Exx., 14. V. 1959, 2 Exx.; Poiso-Arieiro, 19. VI. 1957, 1 Ex.; Valleparaiso, 13. VI. 1957, 4 Exx.; Feiteiras, 15 Exx. (Lu); Ribeira do Inferno, 2 Exx. (Lu).

Westlicher Teil der paläarktischen Region. Der Schwerpunkt in der Verbreitung liegt in Mitteleuropa. Weder von den Azoren noch von der Kanarischen Inseln.