

Porto Santo: 6–12. 1957, 2 Exx.; Baleira, 10–16. IV. 1959, 18 Exx.; Serra de Dentro-Juliana, 13. IV. 1959, 1 Ex.

Bei Untersuchung meines Materiales hat E. WAGNER gefunden, das die vom Madeira-Archipel vorliegenden *Tuponia*-Exemplare zu der von ihm neulich beschriebenen Art *carayoni* — früher von Südfrankreich und der Pyrenäischen Halbinsel bekannt — gehört. Mit grösster Wahrscheinlichkeit gehören die früher von Madeira angeführten Exemplare derselben Art an. Wie die nahestehende *tamaricis* lebt *carayoni* auf *Tamarix*.

#### Atomoscelis Reut.

##### A. onustus (Fieb.)

*Agalliastes onustus* Fieb. Eur. Hem. (1961): 312. — Lindb. 1953: 151.

Porto Santo: Baleira, 6–12. VII. 1957, 3 Exx., 10–16. IV. 1959, 3 Exx.

Auf *Chenopodium* auf Kulturboden. Mediterrane Art. Nicht früher von Madeira gemeldet.

#### Saldidae

##### Saldula v. Duz.

##### S. pallipes (Fabr.)

*Acanthia pallipes* Fabr. Ent. Syst. 4 (1794): 17. — China 1938: 43. — *Saldula p.* Lindb. 1953: 153.

Madeira: 8 Exx. (coll. Wollaston); Serra de Agua, 16–19. VII. 1957, 2 Exx.; São Vicente, 1–2. VII. 1957, 9 Exx.; Pico Ruivo, 27–29. VII. 1957, 1 Ex.

Porto Santo: 8 Exx. (coll. Wollaston); Baleira, 6–12. VII. 1957, 3 Exx.; Serra de Dentro-Pico Juliana, 13. IV. 1959, 1 Ex.

Feuchte Standorte. Wie auf den Kanarischen Inseln auf verschiedenen Höhenlagen. Eurosibirische Art, die von den nördlichen Teilen der paläarktischen Region bis in deren subtropischen Teile verbreitet ist.

##### S. arenicola (Schltz)

*Salda arenicola* Schltz. Arb. Schles. Ges. Kult. (1846): 6. — *Saldula a.* Lindb. 1953: 154.

Nach brieflicher Mitteilung von Dr. H. J. COBBEN liegt *S. arenicola* von Madeira vor. — Angaben über das Vorkommen der Art auf den Kanaren scheinen mir etwas zweifelhaft. — Europa und Nordafrika.

#### Velidae

##### Velia Latr.

##### V. maderensis Noualh.

*Velia currens* var. *maderensis* Noualh. Rev. d'Ent. 1897: 77. — *V. m.* Lundbl. Arkiv f. Zool. Bd. 42 A, 16 (1949): 1. — Lindb. 1941: 30. — 1960: 93.

Madeira: (coll. Wollaston, Noualhier; Rabaçal (Lu), 3 Exx. (Frey), 5–7. V. 1959, 1 Ex. (P), 4 Exx.; Encumeada (B et D); Queimadas, 4 Exx., darunter 1 Larve (B et D), 24–26. VI. 1957, 3 Exx., 14–16. V. 1959, 4 Exx.; Pico Ruivo, 27–29. VI. 1957, 3 Exx., darunter 2 L<sub>V</sub>; Ribeira Frio (B et D); Arieiro (B et D), Poiso-Arieiro, 19. VI. 1957, 2 L<sub>V</sub>, Santa Cruz, Ribeira da Boaventura (B et D).