

Nabidae (alle Funde verzeichnet)

Nabis capsiformis Germ. Faro 1 ♀. (Früher aus Portugal gemeldet.) — *N. ericetorum* Schltz. Gerez, 3 ♀♀, Albergaria 1 ♂ 2 ♀♀, Lousa 1 ♀. (Früher angeführt.) — *N. provencalis* R. Rem. Penhas da Saúde 1 ♂, S. Pedro de Muel 1 ♂ 1 ♀. — *N. pseudoferus* R. Rem. Mira, 1 ♂. — *N. spec. ♀♀ (jeroides* R. Rem. oder *pseudoferus* R. Rem.) — Mira 1, S. João da Campo 1, Penhas da Saúde 1 — Cuba 3.

Anthocoridae

Elatophilus nigricornis (Zett.) Figueira da Foz 1. — *Orius brevicollis* (Rey) Louisa 1. — *O. lindbergi* E. Wagn. Faro 4. — *O. majusculus* (Reut.) S. João da Campo 1. — *Xylocoris obliquus* (Costa) Faro 1. — *Cardiastethus fasciiventris* (Garb.) — Gerez 1.

Myrmedobiidae

Myrmedobia tenella (Zett.) S. João da Campo 1.

Miridae

Pithanus marshalli Dgl. Sc. Faro 1. — *Phytocoris brunneicollis* E. Wagn. Penhas da Saúde 5. — *P. rubropictus* E. Wagn. Faro 4. — *Megacoelum beckeri* Fieb. Sintra, 23—24.VII., 2 (C). — *Calocoris sexguttatus* (Fabr.) Coimbra 3. — *Brachycoleus sexvittatus* Reut. Cuba 2. — *Lygus maritimus* E. Wagn. Estoril, 28.VII., 1 (C), Rio de Mouro, 27.VII., 1 (C). — *L. parvulus* Reut. Sintra, 26.VII., 1 (C), Estoril, 28.VII., 1 (C). — *Macrolophus caliginosus* E. Wagn. Sintra, 23—26.VII., 3 (C). — *Dicyphus cerastii* E. Wagn. Gerez 14, Albergaria 2, Figueira da Foz 1, Coimbra 2. — *D. stachydis* Reut. S. Pedro de Muel 2. — *Pilophorus parvulus* Reut. Estoril 28.VII., 1 (C). — *Orthotylus marginalis* Reut. S. João da Campo 18. — *O. prasinus* (Fall.) Figueira da Foz 1, Estoril, 28.VII., 1 (C). — *O. orthotrichus* Fieb. Lousa 1. — *O. minutus* Jak. Faro 1. — *Heterocordylus parvulus* Reut. S. João da Campo 1, Penhas da Saúde 5, S. Pedro de Muel 3. — *Hadrophyes sulphurella* Put. Faro 4. — *Tinicephalus cisti* Lindb. Lousa 1, Penhas da Saúde 8, S. Pedro de Muel 2. — *Amblytylus delicatus* (Perr.) S. João da Campo 5, Faro 4. — *A. tarsalis* Reut. Cuba 14, Faro 3. — *A. albidus* (Hhn) Faro 15. — *Malacotes lindbergi* E. Wagn. n.sp. S. 21. — *Chrysocnodes rufus* E. Wagn. Coimbra 1, Mira 2. — *Tragiscocoris fieberi* (Fieb.) Gerez 4.

Saldidae

Saldula palustris Dgl. Figueira da Foz 3. — *Pentacora sphaelata* Uhler-Faro 3. — An Ufern der Salinen. Diese aus Spanien und Marokko angeführte Art hat eine weite Verbreitung in Nord-, Mittel- und Südamerika (COBBEN in Stichel, Ill. Bestimmungstab. d. Wanzen, II. Europa. Vol. 3: 213.). Wahrscheinlich von Amerika in den westlichsten Teil des Mittelmeergebietes eingeschleppt.

Veliidae

Velia caprai Tam. f. macr. Cuba 9; f. brach. Gerez 6, S. Pedro de Muel 1 (Vgl. TAMANINI, Bull. Soc. Ent. Ital. LXXXVII, 1957: 149—153). — *V. caprai bertrandi* Tam. Penhas da Saúde f. macr. 6, f. brach. 28.