



Abb. 2: *Dionconotus neglectus creticus* n. ssp., Fig. 13-16 Varianz der Zeichnung

*Dimorphocoris lateralis* REUTER, 1901:

1 ♂ Elaunda b. Aghios Nikolaos unter *Sarcopoterium spinosum*. Sehr kleine Art, welche von Kreta beschrieben war und nur noch in Libyen gefunden wurde.

*Heterocordylus tibialis mediterraneus* E.W., 1967:

1 ♀ Umg. Mallia von *Calicotome spinosa* geklopft, 24.4. - 3.5.80; 2 ♂♂ 4 ♀♀ Umg. Chania, ebenfalls von *Calicotome spinosa* zusammen mit *Tragiscocoris fieberi* und *Orthotylus griseinervis*; Moni Preveli einige Ex. an derselben Pflanze, welche im Gebiet offenbar die Futterpflanze darstellt.

*Orthotylus griseinervis* E.W., 1960:

Umg. Zakros vereinzelt von *Calicotome spinosa* 24.4. - 3.5.80; Kloster Preveli, gleiches Datum und Pflanze; Varnos b. Chania mehrere Ex. von *Calicotome spinosa* mit *Tragiscocoris* und *Heterocordylus*; Umgebung Idäische Grotte b. 1200 m vereinzelt. Wurde von Zypern beschrieben und ist nur in einigen Ländern Nordafrikas wiedergefunden worden.

*Macrotylus soosi* JOS., 1962:

Pałeastró von *Salvia* sp. in Anzahl; 1 ♂ Archanes 14.5.82 lg. Schatz. Wurde vom Autor überprüft, nachdem die Genitalabbildung bei WAGNER "Miriden des Mittelmeerraumes" II: 379 nicht mit der des Autors und dem vorgelegenen Material übereinstimmt. Beschrieben von der Insel Kreta und nur noch vom Libanon bekannt.

*Macrotylus bipunctatus* REUTER, 1879:

1 ♂ 1 ♀ Elaunda b. Aghios Nikolaos unter *Sarcopoterium spinosum*.

*Harpocera hellenica* REUTER, 1876:

6 ♂♂, 4 ♀♀ Umgebung Mallia von *Quercus coccifera* 24.4. - 3.5.80.