



Abb. 4: Fig. 21, 22 linkes Paramer; Fig. 23, 24 rechtes Paramer; Fig. 25, 26 Spikulum der Vesika.

Fig. 21, 23, 25 *Dionconotus neglectus neglectus* v. Bulgarien; Fig. 22, 24, 26 *D. neglectus creticus* n. ssp., Paratype

*Orthonotus creticus* E.W. 1974:

Kloster Gouverneto unter *Ballota pseudodictamnus* einige Ex. 24.4. - 3.5.80; Umgebung Heraklion, Strandbereich unter derselben Pflanze, gleiches Datum. Nur von Kreta bekannt. Nach der Beschreibung sollte das zweite Fühlerglied schwarz sein, die vorliegenden Tiere haben jedoch meist helle.

*Thermocoris algiricus* E.W., 1943:

Ierapetra, Strandbereich vereinzelt von niederer Vegetation. Aus Nordafrika, Zypern und Mazedonien bekannt.

*Conostethus venustus* (FIEB.), 1859:

Ierapetra Strandbereich vereinzelt von niederer Vegetation.

*Stenoparia putoni* FIEB., 1870:

Umgebung Chania Strandbereich zahlreich an *Matthiola tricuspidata* 24.4. - 3.5.80; ebenso am Strand von Mallia, gleiches Datum.

*Tragiscocoris fieberi* (FIEB.), 1858:

Umgebung Mallia, Umgebung Kastelli-Platanos und Aghia Galini in Anzahl auf *Calicotome spinosa* 24.4. - 3.5.80; zahlreich an derselben Pflanze bei Vamos b. Chania, Perkos b. Ano Viannos, Moni Preveli zusammen mit *Heterocordylus tibialis* und *Orthotylus griseinervis*.