

LIVIO TAMANINI

MIRIDI NUOVI O INTERESSANTI PER LA FAUNA ITALIANA

(Hemiptera Heteroptera Miridae)

Presento alcune osservazioni su specie nuove o rare per la fauna italiana, raccolte negli ultimi anni, Vi sono tre elementi a distribuzione orientale e due occidentale che hanno in Italia i loro limiti di espansione. Riporto pure un'indagine sul valore sistematico dell'*Orthocephalus saltator* (Hahn) e dell'*O. ferrarii* Reuter con i disegni delle parti più significative.

*Deraeocoris (Deraeocoris) morio* (Boheman, 1852)

Questo miride nero è ritenuto un elemento montano occidentale ed è stato raccolto con certezza in Inghilterra, Svezia, Germania, Svizzera e Francia; ma non era noto dell'Italia.

Nel giugno 1973 venne raccolto dall'amico A. Galvagni (coll. Museo Civ. Storia Nat. Milano) e dall'autore nei pressi di Tignale in Lombardia a m 640 s.m., su una Labiata del gen. *Thymus*, nell'agosto 1973 a Frabosa Soprana, in località "La Balma", a m 1860 (Piemonte merid.), pure su *Thymus*, e nel luglio 1976 a S. Giacomo di Monte Baldo (Trentino).

*Deraeocoris (Deraeocoris) ribauti* Wagner, 1943

Questa specie franco-spagnola è assai vicina alla precedente, essa venne già segnalata per il Piemonte da SERVADEI (1967: 40). Non la trovo però ricordata per l'Italia nell'ultima revisione di WAGNER (1970); ritengo pertanto necessario confermare la sua presenza anche in Italia.

Ho visto esemplari di *ribauti*, raccolti nei mesi di luglio e agosto a: Cogne in Valle d'Aosta (leg. Schatzmayr, Museo Civico Storia Natur., Milano), Gravere e Brunetta in Valle di Susa (leg. Osella, Museo Civ. St. Nat., Verona), a Pondel, Valmontey e Lillaz sul Gran Paradiso (leg. Osella, detto) ed a Valdieri di Cuneo (leg. Osella, detto).

Il *D. ribauti* Wagn. è un elemento sud-europeo occidentale raccolto in prevalenza sulla Labiata del gen. *Marrubium*.

*Orthocephalus coriaceus* Fabricius, 1776.

L'*O. coriaceus* F. è un elemento oloartico, molto raro in Italia. Le citazioni per il nostro paese si rifanno a GARBIGLIETTI (1869), a MONTANDON (1886) ed a REUTER (1891). Da allora la prima cattura è stata fatta nel luglio 1965 sull'Altopiano di Folgaria (Trentino merid.) in località Ghertele (5 esemplari, leg. A. Galvagni).

*Orthocephalus ferrarii* Reuter, 1891 e *O. saltator* (Hahn, 1835)

L'*O. ferrarii* venne descritto da Reuter su esemplari di Stazzano (Piemonte) come specie assai vicina all'*O. saltator*. Secondo REUTER (1891: 50) i caratteri differenziali delle due entità risiedono nei rapporti di lunghezza tra occhio e fronte, tra il secondo articolo delle antenne ed il terzo, tra il secondo