

È noto di poche regioni appenniniche e di alcune isole (SERVADEI: 229) e sempre su pochi esemplari.

DISTRIBUZIONE GENERALE: circummediterranea.

*Buchananiella continua* (White), 1880

Pericart, 1972: 256

CAL.: Praia a Mare, fiumara di Castro, IX.73, es. 2 sotto detriti vegetali.

La prima segnalazione per l'Italia di questa specie è in Pericart (cita della Liguria). Personalmente ho raccolto una decina di esemplari, con larve, a Peschici (Puglia) sotto piccoli mucchi di fieno e di felci ai margini di un'ampia radura.

DISTRIBUZIONE GENERALE: pantropicale.

*Dysepicritus rufescens* (Costa), 1843

Pericart, 1972: 266

BAS.: Rivello il Palazzo, IX.73, es. 3 sotto detriti vegetali in biotopo leggermente umido.

Questa entità è già nota di diverse regioni italiane (SERVADEI: 228). Personalmente ho visto esemplari dell'Alto Adige (nel terriccio legnoso di pioppo guasto, l. von Peez), del Trentino (sotto il fogliame degli *Alnus* che fiancheggiano l'Adige), Veneto (sotto fogliame in zona umida), Emilia (sotto ramaglie in zona umida), Lombardia (in pianura sotto catasta di ramaglie), Lazio (sotto vegetali guasti, l. c. Heiss).

DISTRIBUZIONE GENERALE: euromediterranea.

*Dufuriellus ater* (Dufour), 1883

Pericart, 1972: 274

BAS.: Nova Siri, v.57, es. 2 sotto la corteccia di ramaglie. CAL.: Melito P. S., v.57, es. 3 sotto corteccia di *Ficus*.

È un corticicolo largamente diffuso in molte regioni italiane (SERVADEI: 229) dalla Valle d'Aosta alla Puglia, dall'Alto Adige alla Sicilia.

DISTRIBUZIONE GENERALE: euromediterraneo-centroasiatica.

*Scoloposcelis pulchella angusta* (Reuter), 1876

Pericart, 1972: 281, 283

BAS.: Mass. Pollino, Serra delle Prete lato N-E, VI.58, es. 1 e 2 ninfe sotto corteccia di *Fagus*. (In

Pericart questo esemplare viene citato per la Calabria ed in Tamanini, 1961 come razza tipica).

Lo *S. pulchella* citato da Mella per il Piemonte si può ritenere appartenga alla subsp. *angusta* Rt., dato che la razza tipica è propria del Nord Europa.

DISTRIBUZIONE GENERALE: sudeuropea (Francia mer., Italia, Austria (valle della Drava l. c. Kofler), Jugoslavia e Bulgaria).

Fam. 18. CIMICIDAE Latreille

*Cimex lectularius* Linnaeus, 1758

BAS.: Nova Siri, v.57, es. 5 in casa abbandonata.

CAL.: Paola, VIII.61, es. 2 in città; Torre Cerchiarra, IX.62, es. 2 in abitazione rurale; Camigliatello, IX.62, es. 1 in albergo.

Questa specie un tempo era comunissima in tutta l'Italia ora, per il largo impiego degli insetticidi, è divenuta una rarità.

DISTRIBUZIONE GENERALE: cosmopolita.

*Oeciacus hirundinis* (Lamark), 1816

Pericart, 1972: 300

CAL.: Serra S. Bruno, VIII.61, es. 1 sotto vecchio nido di rondine.

Questa specie è stata segnalata in poche regioni (SERVADEI: 223); personalmente ho esaminato materiale dell'Alto Adige (Brixen, l. von Peez), del Trentino (Rovereto, in tutti gli stadi) e nel Friuli Venezia Giulia (l. Koch, c. MM).

DISTRIBUZIONE GENERALE: eurosibirico-mediterranea.

Fam. 19. MIRIDAE Hahn

Subfam. Bryocorinae Douglas & Scott

*Monalocoris filicis filicis* (Linnaeus), 1758

Wagner, 1970: 27

BAS.: Mass. Pollino, Piani di Vaquarro, VI.53, es. 4; Lagonegro dint., VIII.73, es. 2. CAL.: Mendicino, IX.51, es. 1 (l. c. Castellani); Gambarie, VII.57 e VI.58, es. 9; Celico, VIII.60, es. 1; Serra S. Bruno, Fabrizia e Caulonia M., VI.61, es. 20. Tutti gli esemplari furono raccolti su varie specie di *Dryopteris*.

È stato osservato in tutte le regioni italiane; è dubbia la sua presenza in Valle d'Aosta, Molise e Sardegna. In alcune stazioni sono stati raccolti esemplari maturi molto chiari, come nella razza