



Fig. 12. Geonemia di *Deraeocoris punctum* Ramb. (A), di *Macrolophus balcanicus* Wagn. (B), di *Macrolophus insignis* Jos. (C), di *Dicyphus tamaninii* Wagn. (D) e di *Aphanosoma italicum* C. (E).

VI.53, es. 7; Nova Siri, v.57, es. 4; Matera, fiume Bradano, IX.76, es. 2 (c. Angelini). CAL.: Pollino, Colloredo, Santicelli, Mazzicanino, Serra delle Prete, VI.51 e 53, es. 6; Bagaladi, Gambarie, Nuca-relle, Longobucco, VII.57, es. 16; Reggio dint., VI.58, es. 2; Sila, Monte Paleparto e Monte Donato, VI.60, es. 2; Fagnano Castiglione, VIII.61, es. 1; Belsito, Cetraro, Cosenza, VIII.62, es. 11; Sibari, IX.62, es. 2; Ciminà, X.66, es. 2; Morano Calabro, IX.73, es. 2; San Giovanni in Fiore m 1300, VII.76 (l. c. Angelini). Vi sono esemplari della forma tipica, f. *extensa* Stichel e f. *hoberlandti* Stichel.

Questa entità, con le sue forme di colore, è una cacciatrice di microinsetti e loro uova, sulle piante più diverse. Essa è frequente in tutte le nostre regioni dal piano fino a 1600 m d'altezza (SERVADEI: 46).

Ha distribuzione: euroturantica macaronese-circummediterranea.

Il *Deraeocoris* (C.) *punctulatus* Fallen, già riportato in Tamanini, 1961, per il Pollino, non viene qui elencato perché si riferisce a una femmina con incerta determinazione e tutti i *Camptobrochis* raccolti sul Pollino come in altre zone della Basilicata e della Calabria risultarono appartenere al *D.* (C.) *serenus* D.-S.

Deraeocoris (*Knighthocapsus*) *lutescens*
(Schilling), 1837
Wagner, 1970: 48

BAS.: Lauria, VII.50, es. 2 (l. c. Castellani); Melfi, M. Vulture, VII.60, es. 2. CAL.: Mass. Pollino:

Colloredo e Santicelli, VI.53, es. 2; Gambarie, VII.57, es. 2; Domanico, M. Scudiero, VIII.62, es. 7. È stato raccolto nella forma tipica e nella f. *innotata* Reut.

Si trova in tutte le nostre regioni ed in alcune delle isole minori (SERVADEI: 45), sulle quercie e poche altre latifoglie.

DISTRIBUZIONE GENERALE: medioeuropeo-circummediterranea.

Alloeotomus gothicus (Fallen), 1807
Wagner, 1970: 55

CAL.: S. Giovanni in Fiore, Castellucci, VIII.60, es. 2 a m 1300 s.m. su *Pinus laricio calabrica* Schn.

Il *gothicus* è stato raccolto recentemente in Valle d'Aosta, Alto Adige, Trentino, Liguria (Colle di Tenda) e Abruzzo, negli ambienti con resinose, dove caccia afidi e uova di altri insetti. Ritengo attualmente Castellucci il punto più meridionale dell'areale della specie, in quanto la citazione per la Sicilia di Reuter non ha avuto alcuna conferma con catture successive.

DISTRIBUZIONE GENERALE: europea.

Subfam. Dicyphinae Reuter

Macrolophus balcanicus Wagner, 1950 (fig. 12B)
Wagner, 1970: 59

CAL.: Cetraro, alveo fiume Triolo, VIII.62, es. 3 su *Lycopersicum esculentum* Mill.

È la prima citazione per l'Italia; la sua distribuzione è sudeuropeo-orientale (transadriatica).