



Fig. 13. I due parameri di *Macrolophus caliginosus* Wagn. (A, B) e di *Macrolophus nubilus* H.-S (C, D).

Macrolophus caliginosus Wagner, 1950 (fig. 13AB)
Wagner, 1970: 60

BAS.: Lauria, VII.51, es. 1 (l. c. Castellani). CAL.: Melito P. S., v.57, es. 3; Montebello I., VII.57, es. 35; Delianuova, VI.58, es. 1; S. Eufemia Lamezia e Gizzeria, VIII.60, es. 9; Caulonia Marina, VIII.61, es. 6; Acri, Ponte Crati, VIII.62, es. 1; Piano Laria, VIII.73, es. 1. Tutti furono raccolti su *Cupularia viscosa* (L.).

Si conoscono catture in Liguria, Toscana, Umbria, Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia e Isole Eolie.

DISTRIBUZIONE GENERALE: circummediterranea.

I *Macrolophus* essicandosi si raggrinzano molto, sono pochi gli esemplari che rimangono intatti, in tal modo i rapporti fra le varie lunghezze (in modo particolare del capo) si alterano tanto da rendere impossibile la determinazione con i soli caratteri esterni. In questi casi, almeno per i nostri *Macrolophus caliginosus* e *M. nubilus*, è utile ricorrere all'esame dei parameri. Nel primo il corpo del paramero ha forma ovale, quasi regolare, nel secondo la parte prossimale è allargata asimmetricamente.

Macrolophus costalis Fieber, 1858
Wagner, 1970: 61

CAL.: Mass. Pollino: Val Santicelli, VI.53, es. 1

su *Cistus salvifolius* L.; Ferdinanda, VIII.61, es. 5 su *Cistus* sp.

Ho visto esemplari anche di Puglia e SERVADEI: 94, di Toscana, I. Capraia, I. Giglio e Sicilia.

DISTRIBUZIONE GENERALE: sudeuropeo-circummediterranea.

Macrolophus insignis Josifov, 1968 (fig. 12C)
Josifov, 1968: 453

CAL.: Cetraro, alveo f. Triolo, VIII.62, es. 1 su *Mentha* sp.

Ho esaminato materiale anche dell'Abruzzo (Chieti, su *Satureja* sp.), Campania (Policastro, su *Mentha* sp.) e Puglia (Otranto).

DISTRIBUZIONE GENERALE: sudeuropea orientale (transadriatica).

Macrolophus nubilus (Herrich-Sch.), 1835
(fig. 13CD)

Josifov, 1961: 87; Wagner, 1970: 60

BAS.: Nova Siri, v.57, es. 2, su *Inula* sp. CAL.: S. Eufemia A., v.57, es. 4; Bagaladi, VII.57, es. 5; Delianuova, VI.58, es. 1; S. Eufemia Lamezia, VIII.60, es. 9; Cetraro, Borgo S. Marco, VIII.62, es. 4. La maggior parte furono raccolti su *Cupularia viscosa* (L.).

È noto del Piemonte, Trentino, Alto Adige, Emi-