

Questa specie in Italia è stata raccolta solo nelle tre regioni indicate in SERVADEI (67). In Bulgaria Josifov (1960) ha raccolto l'*aetnicola* su *Betula verrucosa* Ehr.

DISTRIBUZIONE GENERALE: sudeuropea-orientale.

Psallus (Psallus) helenae Josifov, 1969 (fig. 23C)
Josifov, 1969 e 1973; Wagner, 1975: 212

BAS.: Atella, Laghi di Monticchio, v. e VIII.1968, es. 28 su *Quercus cerris* L. (l. Eckerlein et Hartig, c. Eckerlein e Wagner). Su questo materiale Wagner (1970) descrisse *Psallus appenninicus*, riconosciuto poi da Josifov sinonimo di *P. helenae*.

DISTRIBUZIONE GENERALE: sudeuropea-orientale.

Psallus (Psallus) lucanicus Wagner, 1968
Wagner, 1975: 207

BAS.: Rionero, Monte Vulture, VI.1967, es. 8, materiale tipico sul quale venne fatta la descrizione del *lucanicus* (l. Hartig, c. Eckerlein et Wagner). È un endemita proprio della Basilicata.

Psallus (Psallus) scholtzii Fieber, 1861 (fig. 20C)

Wagner & Weber, 1964: 473
syn. *P. aliciae* Kusch. 1938 (l. Scholtz 1939)

CAL.: Aprigliano, Spineto, VIII.60, es. 3 su *Alnus glutinosa* Gaertn.; Spezzano Piccolo, VIII.60, es. 6 su *Alnus cordata* Loisel.; Serra S. Bruno, VIII.61, es. 1; Camigliatello, IX.61, es. 10 su *Alnus glutinosa* Gaertn.

In SERVADEI: 70, questa specie montana è indicata del Piemonte, Emilia e Puglia; personalmente ho visto esemplari anche di Sardegna (raccolti su *Alnus glutinosa* Gaertn.).

DISTRIBUZIONE GENERALE: europea montana.

Psallus (Psallus) varians (Herrich-Schaeffer), 1842
Wagner, 1975: 194

BAS.: Lagonegro, Lago Remmo, v.73, es. 1 (l. Bucciarelli, c. MM). CAL.: Pollino, Gaudolino, VI.53, es. 2 su *Tilia* sp.; Aspromonte, Montalto, VI.58, es. 1 su *Fagus sylvatica* L.

Ho esaminato esemplari di questa specie del Trentino (su *Quercus petraea* Liebl.); Friuli Venezia Giulia (l. Schatzmayr, c. MM), Campania (su *Crataegus* sp.), Sicilia (su *Quercus ilex* L.).

DISTRIBUZIONE GENERALE: euroanatolica.

Oncotylus nigricornis Saunders, 1876 (fig. 29A)
Wagner, 1975: 255

CAL.: Gambarie, VI.58, es. 1 su *Centaurea solstitialis* L.

Il *nigricornis* è stato raccolto sulla stessa pianta, ed in diversi esemplari adulti e larve, anche in Sicilia. In SERVADEI: 52, è citato di Sardegna, ma si rifà alla segnalazione di Costa del 1884.

DISTRIBUZIONE GENERALE: mediterranea occidentale.

Orthonotus cylindricollis (Costa), 1852
Wagner, 1975: 279

BAS.: Picciano (Jazzo), VI.58, es. 1 femm. (l. e c. Servadei).

È una specie piuttosto rara; SERVADEI: 60, ce la indica di sei regioni. Ho visto esemplari della Toscana (Massarella, su *Urtica*), Marche (Camerino e Montemonaco su *Cerastium tomentosum* L.) e Campania (Bagnoli su *Urtica dioica*).

DISTRIBUZIONE GENERALE: nordmediterranea.

Phylus coryli (Linnaeus), 1758
Wagner, 1975: 287

BAS.: Rionero, Monte Vulture, VII.60, es. 2. CAL.: Pollino, Gaudolino, VI.53, es. 8 su *Corylus avelana* L.

La specie è presente in quasi tutte le regioni italiane come indicato in SERVADEI: 61.

DISTRIBUZIONE GENERALE: europea.

Amblytylus brevicollis Fieber, 1858
Wagner, 1975: 312

BAS.: Montalbano Ionico, Policoro, v.57, es. 14 su *Medicago hispida* Gaertn. CAL.: Melito P. S., v.57, es. 1 su *Medicago* sp.; Gambarie, VI.58, es. 2 su *Medicago hispida* Gaertn.

Alla distribuzione nelle regioni italiane che ci dà SERVADEI (59) possiamo aggiungere le Marche e l'Umbria (catture su *Medicago* sp.).

DISTRIBUZIONE GENERALE: mediterraneo-occidentale.

Amblytylus nasutus (Kirschbaum), 1850
Wagner, 1975: 301

CAL.: Mass. Pollino, Colloredo, VI.53, es. 2, su Graminacee.