

темные экземпляры *S. melanoscela* Fieb., но этот вид отличается прямыми боковыми краями переднеспинки и меньшими размерами. Кроме того, у *S. melanoscela* бедра часто черные, светлые лишь на вершине. *S. saltatoria* L. близок к новому виду по форме переднеспинки и по рисунку надкрылий у очень темных экземпляров, отличается от него следующими признаками.

- 1 (2). Лоб только с прижатым опушением, нижняя часть мандибулярной пластинки часто светлая. Эндокориум с продолговатым глазчатым пятном в передней половине, у очень темных особой отсутствующим. Экзокориум по всему наружному краю с прерванным окаймлением. Парамеры, как на рис. 9. Длина тела ♂ 3.3—4.1, ♀ 3.5—4.5 мм
 *S. saltatoria* L.
- 2 (1). Лоб кроме прижатого опушения с приподнятыми длинными черными волосками; нижняя часть мандибулярной пластинки всегда темная. Эндокориум без глазчатого пятна в передней половине. Экзокориум по наружному краю с двумя короткими светлыми пятнами. Парамеры, как на рис. 6, 7 *S. mariae* sp. n.

Сем. MIRIDAE

Plagiognathus (s. str.) *pini* Vinokurov, sp. n.

Тело удлиненное, стройное. Верх в легко опадающих торчащих черных волосках, более длинных и грубых на голове и переднеспинке и в тонком полуприподнятом светлом опушении.




Рис. 10—19.

10—14 — *Plagiognathus pini* sp. n. (северо-восточная Якутия, с. Тебюлях): 10 — верхушка эдеагуса, 11 — тека, 12 — левый парамер, вид снизу, 13 — левый парамер, вид сверху, 14 — правый парамер; 15—19 — *P. obscuriceps* Stål (центральная Якутия): 15 — верхушка эдеагуса; 16 — тека, 17 — левый парамер, вид сбоку, 18 — левый парамер, вид сверху, 19 — правый парамер.

Голова темно-бурая до черной, с большим беловато-желтым пятном на темени, ширина ее 0.72—0.82 мм. Темя в 1.50—1.82 раза шире глаза. Хоботок темно-бурый, достигающий вершины задних тазиков или слегка заходящий за них. 1-й и 2-й членики