

LA VALIDITÉ DE L'ESPÈCE
STRONGYLOCORIS OBERTHURI REUTER
(Hem. Het. Miridae)

par Edouard WAGNER, HAMBOURG

L'espèce *Strongylocoris oberthuri* a été décrite par REUTER en 1905 (1) sous le nom de *Strongylocoris obscurus* Rmb. var. *oberthuri* Reut., qui en avait, pour la décrire, trois exemplaires trouvés par M. OBERTHUR dans les Pyrénées-Orientales près de Vernet-les-Bains. M. le professeur RIBAUT, Toulouse, m'a informé que, depuis cette publication, il n'y en avait plus d'autres trouvailles ni de cette région, ni d'autres. Au cours de cette année, M. le docteur W. GRAVESTEIN, Amsterdam, rapporta d'un voyage aux Pyrénées-Orientales 2 ♂♂ et 4 ♀♀ de cette espèce qu'il eut l'amabilité de me prêter pour examen attentif. Le lieu où l'espèce a été trouvée est, de nouveau, près de Vernet-les-Bains, mais deux exemplaires viennent du Col de Jou. C'est la première fois après cinquante ans, que l'on retrouve cette espèce. De l'examen de ce matériel il résulte que *Str. oberthuri* Reut. est une bonne espèce et qu'il n'est plus possible d'en parler comme d'une variété de *Str. obscurus* Rmb.

La taille de *Str. oberthuri* est visiblement plus svelte que celle de *Str. obscurus*. La tête de *Str. oberthuri* est plus étroite et le vertex du ♂ est 2,4 - 2,6 fois, de la ♀ 2,8 - 3,0 fois aussi large que l'œil relativement grand, tandis que la tête de *Str. obscurus* est plus large (fig. 1) et le vertex du ♂ 3,0 fois, de la ♀ 3,3 - 3,5 fois aussi large que l'œil, beaucoup plus petit. Le bord postérieur du vertex de *Str. oberthuri* montre au milieu une fosse avec une bosse épaisse et à côté du bord interne de l'œil une fosse ocelliforme. Le bord postérieur du vertex de *Str. obscurus* présente seulement une fosse transversale égale.

Les poils de la partie supérieure du corps de *Str. oberthuri* sont plus forts et plus longs.

(1) Bull. Soc. Ent. Fr., 1905, 8.