

Art unterscheidet sich *H. montanus* Ldbg. leicht durch die Färbung der Schienen. Überdies ist *H. genistae* von kleinerer, schlanker Gestalt, der Kopf ist schmaler und der Scheitel des ♀ (Fig. 6) nur 2,45mal so breit wie das große, runde Auge, das 2. Fühlerglied ist schlanker, 8,3mal so lang wie dick, die Behaarung ist kürzer und die dickste Stelle des Gliedes liegt der Spitze näher (Fig. 4). Auch *H. benardi* Horv. ist unserer Art ähnlich, hat jedoch ein zylindrisches 2. Fühlerglied, das überdies braun gefärbt ist, die Schienen sind einfarbig gelbbraun einschließlich von Grund und Spitze, während der Scheitel nur 2mal so breit ist wie das Auge.

Das hier vorliegende ♀ (Allotypoid) ergänzt nicht nur unsere Kenntnisse der LINDBERGSchen Art, sondern ermöglicht überdies eine bessere Trennung von den übrigen Arten der Gattung.

2. Das bisher unbekanntes ♂ von *Pachytomella alutacea* Puton 1874

Beschreibung: Langgestreckt (Fig. 7), in Größe und Gestalt dem ♂ von *P. parallela* M. D. sehr ähnlich. Schwarz, mit feinen gelbbraunen Haaren bedeckt, die Halbdecken zum großen Teil gelblich braungrau. Makropter, Halbdecken die Hinterleibsspitze weit überragend.

Kopf von oben gesehen (Fig. 8) kurz und breit, nur wenig schmaler als das Pronotum, von vorn gesehen (Fig. 9) deutlich breiter als hoch. Scheitel am Hinterrande mit dickem, wulstigem Kiel, vor demselben 3 nebeneinander liegende Grübchen (Fig. 8). Scheitel 2,15mal so breit wie das vorstehende, runde Auge. Fühler schwarz, kurz und kräftig; 1. Glied 0,6mal so lang wie der Scheitel breit ist, mit einzelnen Borsten; 2. Glied kräftig, zylindrisch, 1,1mal so lang wie der Kopf breit ist, mit schwarzer Behaarung; 3. Glied etwas weniger als halb so lang wie das 2. und wesentlich dünner (4. Glied fehlt).

Pronotum trapezförmig (Fig. 8), Seiten und Hinterrand leicht geschweift, hinterer Teil kräftig quer gerunzelt. Scutellum gewölbt, in der Mitte mit dreieckigem Grübchen, querverunzelt. Halbdecken gelblichbraungrau, Innenrand und Kommissur des Clavus breit schwarz, Außenrand des Corium schmal, derjenige des Cuneus breit schwarz (Fig. 7); Membran schwärzlich, etwas durchscheinend, Adern schwarzbraun.

Unterseite schwarz, Stinkdrüsenöffnungen und der Rand des Konnexivum schwarzbraun. Schnabel schwarzbraun, 1. und 4. Glied schwarz. Schenkel schwarz, distal breit braun, Schienen schwarzbraun, Basis gelbbraun, mit feinen hellen Haaren bedeckt, dazwischen einzelne feine schwarze Dornen. Tarsen schwarz, schlank.

Länge: 3,67 mm, Breite des Pronotum: 4,0 mm.

P. alutacea Put. (1874) war bisher nur im weiblichen Geschlecht bekannt, auch REUTER (1891) und STICHEL (1956) erwähnen nur das ♀. Die Art wurde bisher nur in den höheren Gebirgen Spaniens gefunden. Das hier vorliegende ♂ (Allotypoid) stammt aus der Sierra Nevada (Tal des Rio