

## Familie LYTCORIDAE Reut.

*Lyctocoris campestris* (F.): Sicilia orientalis: dint. Taormina 200 m 11.6.50 1 ♂ (Hartig et Griesheim leg.). - Sonstige Verbreitung: Die Art ist fast Cosmopolit und scheint nur in der Aethiopischen Region zu fehlen.

## Familie MIRIDAE Hhn.

*Phytocoris parvulus* Reut.: Sicilia orientalis: dint. Taormina 200 m, 9-11.6.50 1 ♀ (Hartig et Griesheim leg.). - Sonstige Verbreitung: Westliches Mittelmeergebiet, Ungarn.

*Phytocoris italicus* E. Wagn.: Sicilia orientalis: dint. Taormina 200 m 9-1.6.50 4 ♂♂ (Hartig et Griesheim leg.). - Sonstige Verbreitung: Nur aus Italien bekannt.

*Creontiades pallidus* (Rmb.): Sicilia orientalis: dint. Taormina 200 m 2.6.50 3 ♂♂, 2 ♀♀ (Hartig et Griesheim leg.). - Sonstige Verbreitung: Mittelmeergebiet, Kanarische Inseln, Arabien, äthiopische Region.

*Cyphodema instabile* (Luc.): Sicilia orientalis: dint. Taormina, Sifone 200 m 5.6.50 1 ♀ (Hartig et Griesheim leg.). - Sonstige Verbreitung: Westliches Mittelmeergebiet, Zypern, Syrien.

*Dionconotus cruentatus* (Brullé): Sicilia orientalis: dint. Taormina, Mte. Ziretto 200-400 m 24.5.50 4 ♂♂, 3 ♀♀, Torre te. S. Antonio 17.3.50 2 ♀♀ (Hartig et Griesheim leg.). - Sonstige Verbreitung: Durch das ganze Mittelmeergebiet verbreitet.

*Macrolophus caliginosus* E. Wagn.: Sicilia orientalis: dint. Taormina 200 m 23.5.50 4 ♂♂, 4 ♀♀ (Hartig et Griesheim leg.). - Sonstige Verbreitung: Westliches Mittelmeergebiet bis zum Balkan.

*Orthotylus virescens* Dgl. Sc.: Sicilia orientalis: dint. Taormina 200 m 23.5.50 3 ♂♂ (Hartig et Griesheim leg.). - Sonstige Verbreitung: Europa, Nordasien, Mittelmeergebiet.

*Pachyxyphus lineellus* (Mls.): Sicilia orientalis: Messina-Ritiro 100 m 29.4.50 7 ♂♂, 8 ♀♀ (Hartig et Griesheim leg.). - Sonstige Verbreitung: Durch das ganze Mittelmeergebiet verbreitet.

*Tragiscocoris fieberi* (Fieb.): Sicilia orientalis: dint. Taormina 200 m 22.5.50 1 ♂ (Hartig et Griesheim leg.). - Sonstige Verbreitung: Nur im Mittelmeergebiet.

## Familie GERRIDAE Leach

*Gerris costai fieberi* Stich.: Sicilia orientalis: Messina-Ritiro 100 m 29.4.50 1 ♂, 1 ♀ (Hartig et Griesheim leg.). - Sonstige Verbreitung: Die Subspecies *fieberi* Stich. ist ostmediterrän, die Art bewohnt ausserdem Mittel- und Westeuropa.

*Gerris najas* (Deg.): Die von mir (1955) als *G. cinereus* Put. gemeldeten Tiere sind nicht diese Art sondern gehören zu *G. najas* Deg. Sie weichen allerdings in einigen Merkmalen von mitteleuropäischen Tieren ab. Sonstige Verbreitung: *G. najas* ist durch ganz Mittel- und Nordeuropa verbreitet, bewohnt aber auch Teile des Mittelmeergebietes.

## Familie NEPIDAE Leach

*Nepa sardiniensis* Hung.: Lazio: B'ni di Tivoli 21.7.52, in aqua sulf. 8 ♂♂, 10 ♀♀ (Hartig leg.). - Sonstige Verbreitung: Bisher nur auf der Insel Sardinien gefangen.