

*Le style gauche* est très grand et robuste chez *P. mollis* (fig. 13), sa région apicale est fortement épaissie, le lobe sensoriel pointu et l'apophyse longue et courbée vers le bas. Chez *P. cruentatus* (fig. 14) le style est plus petit, le lobe sensoriel court et épais, l'apophyse grêle et droite. Le style droit (fig. 16 + 17) est très semblable chez les deux espèces.

*La partie apicale de la thèque* est robuste chez *P. mollis* (fig. 19) et munie d'une petite pointe. Elle est plus petite chez *P. cruentatus* (fig. 20), épaissie à la base et acuminée vers l'apex.

*Le vertex* de *P. mollis* est 1,5-1,6 fois chez le ♂, 1,9-1,95 fois chez la ♀ plus large que l'œil, tandis que celui de *P. cruentatus* est 1,4 fois chez le ♂, 1,6 fois chez la ♀ plus large que l'œil.

Nous avons trouvé le *P. mollis* dans les Hautes-Alpes (Gap) sur *Quercus robur* L. et le *P. cruentatus* Mls. dans les Pyrénées-Orientales (Le Perthus) sur *Quercus pubescens* Willd.

## 2. *Psallus aurora* Mulsant 1852

La séparation de *P. aurora* des deux espèces précédentes est plus facile et se fait en général déjà en observant la coloration. Chez cette espèce la face dorsale montre sur le pronotum, sur le clavus et sur la partie basale de la corie des petits points bruns ou d'un brun rougeâtre (fig. 3), la partie apicale de la corie et le cuneus sont très souvent, en plus de la coloration rougeâtre, tachés d'un brun obscur.

La taille et la forme (fig. 3) sont très semblables à celles de *P. cruentatus* de même que la forme des fémurs. Les taches des fémurs, par ailleurs sont assez grandes et très nettes (fig. 6). Les ongles (fig. 9) sont plus longs et plus grêles, mais moins fortement courbes. Les pseudarolia sont courts et larges et s'étendent jusqu'au milieu de l'ongle. Le pénis est plus long et plus svelte, sa partie apicale (fig. 12) est munie de 2 pointes chitineuses longues et courbées, le lobe membraneux est étroit et ses dents sont assez petites. Le style gauche (fig. 15) est beaucoup plus petit, ses pointes sont courtes et obtuses. Le style droit (fig. 18) est plus large et son apophyse très petite. La partie apicale de la thèque (fig. 21) est longue et grêle.

Cette espèce se trouve aussi sur les chênes dans la région méditerranéenne.

## 3. *Psallus pallidus* Reuter 1880

Cette espèce a été décrite par REUTER d'après quelques femelles, trouvées par M. PANDELLÉ dans les Pyrénées. Comme c'était LETHIERRY qui avait communiqué ces spécimens à REUTER, nous avons cherchés le matériel typique dans la collection de LETHIERRY qui se trouve dans le Museum National d'Histoire Naturelle à Paris. Là nous avons trouvé