

Auch von dieser Art lag mir nur von den Kanarischen Inseln (Gran Canaria, La Palma) Material vor. Sie ist auch bisher nur auf dieser Inselgruppe festgestellt. LINDBERG (1953) fing die Art nur auf strauchartigen *Hypericum*-Arten.

4. *Lindbergocapsus rumicis* (Lindberg) 1953 (Abb. 14)

Psallus rumicis Lindberg 1953, Soc. Sci. Fenn. Comm. Biol. XIV (1): 143. Auch diese Art gehört wegen des Baues der Klauenanhänge (Fig. 1 i) und desjenigen der Genitalien des ♂ (Fig. 13, e—k) in die Gattung *Lindbergocapsus* nov. gen. Die Behaarung der Oberseite (Fig. 2 f) besteht aus anliegenden, gelblichen, glänzenden Haaren, die dünn und haarähnlich sind, aber den Schuppenhaaren der vorangehenden Arten entsprechen und halbaufgerichteten, längeren Haaren, von denen die meisten hellgelblich sind, eine Anzahl, vor allem an den Rändern aber schwarz ist. Die anliegenden Haare sind bei seitlicher Betrachtung schlanker als bei Betrachtung von oben, sie sind also im Querschnitt oval. Grundfarbe hell gelblich, mit roten Flecken, vor allem auf dem Pronotum, dem Scutellum und dem hinteren Teil des Corium (Fig. 14 a), beim ♀ oft ausgedehnter rot. Bisweilen sind nur verstreute rote Flecke vorhanden. Fühler hell gelblich, das 4. Glied, beim ♂ oft auch das 3. etwas verdunkelt. Schenkel hellgelb, mit deutlichen braunen oder schwarzen Flecken, vor allem auf der Unterseite. Schienen mit grossen, schwarzen Punkten, die mindestens so gross sind, wie die Schiene dick ist. Die Dornen der Schienen sind schwarz.

Kopf kurz und breit, von vorn gesehen (Fig. 14 b) bei ♂ und ♀ etwa $1,4 \times$ so breit wie hoch. Scheitel beim ♂ $1,38 \times$, beim ♀ $2,1-2,2 \times$ so breit wie das runde, vorstehende Auge. Seitlich gesehen (Fig. 14 c) ist der Kopf geneigt, gewölbt und höher als breit, das Auge bedeckt beim ♂ fast die ganze Kopfseite. 2. Fühlerglied beim ♂ etwas dicker als beim ♀, beim ♂ so lang, beim ♀ $0,85-0,88 \times$ so lang wie das Pronotum hinten breit ist. Dornen der Schienen schrägstehend, kaum länger




Abb. 14. *Lindbergocapsus rumicis* Lindb.

a = ♂ ($13,5 \times$) b = Kopf von vorn, oben ♂, unten ♀ ($31,5 \times$) c = Kopf des ♂ seitlich ($31,5 \times$) d = Hinterfuss ($67 \times$) e = Genitalsegment des ♂ von oben ($31,5 \times$) f = rechter Genitalgriffel von oben ($84 \times$) g = linker Griffel von oben ($84 \times$) h = Vesika des Penis seitlich ($84 \times$) i = Spitzenteil derselben ($120 \times$) k = Spitzenteil der Theka seitlich ($84 \times$)