

Eduard WAGNER  
(Hamburg)

**Kilka nowych gatunków z podrodziny *Phylinae* DGL. et SC.  
(*Hemiptera Heteroptera, Miridae*)**

**Несколько новых видов из подсемейства *Phylinae* DGL. et SC.  
(*Hemiptera Heteroptera, Miridae*)**

**Einige neue Arten aus der Unterfamilie *Phylinae* DGL. et SC.  
(*Hemiptera Heteroptera, Miridae*)**

[Mit 4 Textabbildungen]

1. *Harpocera atlantica* sp. n.

Gestalt klein und schlank, das ♂ fast parallelseitig und 3,3 mal, das ♀ langoval und 2,6 mal so lang wie das Pronotum breit ist. Mit starkem Sexualdimorphismus, der sich vor allem im Bau der Fühler findet, aber auch die Gestalt [Fig. 1 c und d], die Länge der Beine und die Färbung zeigen starke Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Ockergelbbraun, mit roter und schwarzbrauner bis schwarzer Zeichnung, die beim ♂ ausgedehnter ist als beim ♀. Oberseite mit gelblicher, heller, krauser, anliegender Behaarung, glänzend, leicht gerunzelt.

Kopf geneigt, von oben gesehen viel breiter als lang. Scheitel hinten mit kräftigem, stumpfem Querkiel, beim ♂ 1,9—2,0 mal, beim ♀ 2,2—2,4 mal so breit wie das graubraune, gekörnte Auge. Tylus etwas vorstehend, breit abgerundet. Kehle kurz und steil. Beim ♂ ist der innere Augenrand und ein grosser Fleck auf dem Scheitel, der nur eine schmale Mittellinie und den hinteren Teil des Scheitels freilässt, schwarz. Beim ♀ sind nur undeutliche braune Flecke vorhanden. Fühlerhöcker etwas von der unteren Augenecke entfernt. Fühler