

EDUARD WAGNER

DREI NEUE ARTEN  
AUS DER UNTERFAMILIE *PHYLINAE* DGL. et SC.

(Hem. Het. *Miridae*)

1. *Plagiognathus (Poliopterus) strigifemur* nov. spec.

Gestalt beim ♂ länglich und 3,0x, beim ♀ etwas kürzer und 2,85x so lang wie das Pronotum breit ist. Hell gelblichweiss bis ockergelb. Fühler schwarz (♂) oder im basalen Teil schwarz (♀). Behaarung der Oberseite fein, hell und fast anliegend. Membran mit dunkler Zeichnung und Beine mit schwarzen Flecken und Punkten.

Kopf geneigt (Fig. 1,a+b) viel breiter als lang, hell ockergelb, nur die Spitze des Tylus schwarz. Scheitel beim ♂ 1,8x, beim ♀ 2,8x so breit wie das braune Auge. Von vorn gesehen (Fig. 1,c+d) ist der Kopf breiter als hoch, distal spitz und unter den Augen nur wenig verlängert. Seitlich gesehen (Fig. 1,e+f) steht der Tylus nur wenig vor, ist gekrümmt und distal rückwärts gerichtet. Stirn und Scheitel nur wenig gewölbt, schräg abfallend. Auge gross, den grössten Teil der Kopfseiten einnehmend. Fühlerwurzel an der unteren Augenecke gelegen und dem Augenrand sehr nahe. Fühler beim ♂ (Fig. 1h) schwarz, nur die Spitzen der Glieder schmal weisslich, beim ♀ (Fig. 1g) rotbraun mit Ausnahme von Glied 1 und der basalen Hälfte von Glied 2. Das 1.Glied kurz und dick, beim ♂ 0,5x, beim ♀ 0,4x so lang wie der Scheitel breit ist; 2.Glied stabförmig, beim ♂ 1,05x, beim ♀ 0,93x so lang wie der Kopf breit ist; 3.Glied schlanker und 0,70-0,75x so lang wie das 2. und 1,50-1,67x so lang wie das 4.

Pronotum (Fig. 1,a+b) trapezförmig, 2,4-2,5x so breit wie lang und 1,33x (♂) bis 1,47x (♀) so breit wie der Kopf samt Augen. Seiten gerade, Vorder- und Hinterrand leicht eingebuchtet. Schwielen undeutlich, wenig gewölbt. Schildgrund zum grössten Teil frei, oft rotgelb. Corium kurz und verhältnismässig breit. Cuneus bräunlich, proximal hell. Membran rauchbraun, hinter der Cuneuspitze ein heller Fleck. Adern braun.

Unterseite hell, ungefleckt. Das Rostrum reicht bis zum Ende der Mittelbrust. Beine einfarbig hell gelblich, mit feiner, heller Behaarung. Schenkel nur an der Spitze schwarz gefleckt, Vorder- und Mittelschenkel dort (Fig. 1k) an der Oberkante mit schwarzem Längsstreif, Hinterschenkel (Fig. 1i) mit einem