

des Penis und gehört damit zur *T. hippophaes*-Gruppe. Im Bau der Genitalien des ♂ zeigen sich Anklänge an *T. concinnoides* Linnav. Aber auch diese Art ist kleiner, 2,1-2,4 mm lang, und hat deutliche schwarze Punkte an den Schienen, der Scheitel ist beim ♂ nur 1,78-2,0 ×, beim ♀ 2,66 × so breit wie das Auge. Außerdem sind Zeichnung und Behaarung anders.

Material: 8 ♂♂ und 7 ♀♀ von der Insel Zypern: Ayos Amvrosios 25.V.1972, leg. H. Eckerlein. Holotypus und Paratypen in meiner Sammlung, Paratypen auch in der Sammlung von H. Eckerlein.



Abb. 7. *Tuponia (Chlorotuponia) rhodensis* nov. spec.

a = Kopf und Pronotum des ♂ von oben, b = dasselbe des ♀, c = Kopf des ♂ von vorn, d = Kopf des ♀ von vorn, e = rechtes Paramer von oben, f = linkes Paramer von oben, g = Vesika von rechts, h = Apikalteil der Theka von rechts, i = Hinterfuß, k = Klaue desselben von außen.

7. *Tuponia (Chlorotuponia) rhodensis* nov. spec.

Klein, schlank, 3,0 × so lang wie die Pronotumbreite. Behaarung lang, fein und schwarz. Gelb, nur der innere Teil des Corium und der Cuneus grün.

Kopf (Fig. 7, a + b) kurz und breit. Scheitel beim ♂ 0,9 ×, beim ♀ 2,7 × so breit wie das Auge. Fühlergrube vom Auge etwas entfernt. Von vorn gesehen (Fig. 7, c + d) ist der Kopf etwa 1,5 × so breit wie hoch und unter den Augen stumpf. Fühler gelblich, 1. Glied sehr kurz; 2. Glied schlank, beim ♂ 1,0 ×, beim ♀ 0,84 × so lang wie die Pronotumbreite.

Pronotum (Fig. 7, a + b) trapezförmig, kurz und breit. Scutellum gelb, seine Basis teilweise frei. Außenrand des Corium beim ♂ fast gerade, beim ♀ nach außen gebogen. Beine hellgelb. Schienen ohne Punkte. Dornen schwarz, schräggehend, etwas länger als die Schiene dick ist. An den Hintertarsen ist das 3. Glied 1,1-1,2 × so lang wie das 1. und 2. Glied zusammen (Fig. 1, i), die beiden basalen Glieder sind etwa gleich lang. Klauen (Fig. 7, k) schlank, gleichmäßig gekrümmt und verjüngt. Das Rostrum reicht bis zu den Hinterhüften.

Genitalsegment des ♂ kegelförmig. Rechtes Paramer (Fig. 7, e) schlank, Hypophysis lang und schlank, außen mit feinen schwarzen Haaren. Linkes Paramer (Fig. 7, f) distal spitz, Hypophysis lang und gerade, auf dem Sinneshöcker ein schlanker, abwärts gekrümmter Fortsatz. Vesika des Penis (Fig. 7, g) S-förmig, schlank, Apikalteil mit langen, fast geraden Chitinstäben, von den beiden kürzeren Chitinstäben steht der innere stark ab. Sekundäre Gonopore nahe der Spitze. Apikalteil der Theka (Fig. 7, h) proximal stark bauchig erweitert, distal eine lange, fast gerade, dünne Spitze.

Länge: ♂ = 2,5 mm, ♀ = 2,8 mm.

*T. rhodensis* n. sp. gehört in die Untergattung *Chlorotuponia* E. Wagn. und inner-