

*Ischnoscelicoris* Reuter, 1886

*rubrinervis* (Reut.), 1880: Trip: Kseia 3.—5. 5. 61, 10 km südl. Tripolis 30. 4. 61 sehr reichlich, 20 km östl. Tagiura 14. 4. 65 4 ♀♀, Jebel Nefoussa Garian 29. 4. 65 3 ♂♂, 1 ♀, 20 km westl. Gasr-el-Garabulli 3. 5. 65 5 ♂♂, 6 ♀♀ an *Stipa tenacissima* L. — Nordafrika, Palästina, Syrien, Libanon (saharo-sindisch?).

*Creontiades* Distant, 1883

*pallidus* (Rmb.), 1842: Lit: Trip: Misurata 9.13 (Mancini 1936); Cyr: Oasi di Augila 9.34 (Mancini 1935); Trip: Hon 9.36; Fezz: Tin Alcun 10.36, Tin Caraden 1. 10. 36 (Mancini 1942); Trip: Homs 27. 8. 62, Zuara-Tripolis 27. 8. 62 (Linnavuori 1965); Fezz: Sebha di Cuma (de Bergevin 1932, Zavattari 1934); Siwa/Ägypten (Hoberlandt 1953) — Mittelmeergebiet und äthiopische Region.

*Calocoris* Fieber, 1858, subgen *Macrocalocoris* E. Wagn. 1968

*nemorialis* (F.), 1787: Cyr: 10 km El Merj 22. 4. 65 10 ♂♂, 3 ♀♀, Cyrene 22. 4. 65 1 ♂, 1 ♀, Baiada 25. 4. 65 1 ♂, 1 ♀; Trip: Jebel Nefoussa Garian 29. 4. 65 1 ♂. Lit: Cyr: Benina 11. 4. 35, El Merj (Mancini 1942a); Cyrene, Subba, Bir Candula (Zavattari 1934) — Mediterrane Art.

*Calocoris* Fieber 1858, subg. *Calocoris* s. str.

*roseomaculatus* (Deg.), 1773: Lit: Cyr: Benina 11. 4. 35 (Mancini 1942a) — Europa und Teile des Mittelmeergebietes.

*norvegicus* (Gmel.), 1788: Trip: Gusbat 3. 5. 61 1 ♀; Cyr: Baiada 25. 4. 65 7 ♂♂, 9 ♀♀. Lit: Cyr: Uadi Belgadir 27. 4. 35 (Mancini 1942a) — Europa, Mittelmeergebiet, nearktische Region.

*tunetanus* E. Wgn., 1942: Trip: Kseia 3. 5. 61 15 ♂♂, 15 ♀♀, 20 km östl. Tagiura 14. 4. 65 2 ♂♂, 2 ♀♀; Cyr: 10 km El Merj 22. 4. 65 zahlreich; Trip: Jebel Nefoussa Garian 29. 4. 65 4 ♂♂, 1 ♀ — Algerien, Tunesien.

*instabilis* Fieb., 1861: Cyr: Cyrene 22. 4. 65 3 ♂♂, 2 ♀♀, Baiada 25. 4. 65 1 ♀. Lit: Cyr: Benghazi, Benina, Soluck, Chersa, Uadi Belgadir (Mancini 1936, 1942a); Cyr: Bardia (de Bergevin 1930, Zavattari 1934), Zavattari (1934) meldet *C. rubriventris* H. - S. aus Cyr: Benghazi, Cirene, Derna (Gighi leg.). Wahrscheinlich ist damit *C. instabilis* Fieb. gemeint. — Mediterrane Art.

*regularis* Put., 1888: 60 km östl. Nalut 30. 4. 65 1 ♀. — Bisher nur aus Algerien.

*Eurystylus* Stål, 1870

[*bellevoeyi* (Reut.), 1879]: Siwa/Ägypten (Hoberlandt 1953) — ostmediterran.

*Dichrooscytus* Fieber, 1858

*algiricus* E. Wgn., 1951: eine häufige Art an *Juniperus phoenicea* L. und breitwüchsigen Zypressen. Cyr: Gubba 2. 5. 63 1 ♂, 3 ♀♀, Wadi el Kuf 2 ♂♂, 5 ♀♀ Benghazi, 1 ♀, 10 km El Merj 22. 4. 65 3 ♀♀ — Algerien und Spanien.

*Taylorilygus* Leston, 1952

*pallidulus* (Blanch.), 1852 (*apicalis* Fieb., 1861): Trip: Leptis Magna 28. 4. 65 5 ♂♂, 6 ♀♀; Cyr: Benghazi 21. 4. 65 2 ♂♂. Lit: Cyr: Uadi Derna 23. 4. 35