

El Merj 31. 8. 62 an *Juniperus phoenicea* L. (Linnavuori 1965) Die Art auch in Tunesien und der Türkei, die Subspecies bisher nur in Libyen.

*Orthotylus* Fieber, 1858 subgen. *Melanotrichus* Reuter, 1865

*fieberi* Fr.-Gssn.; 1864: Trip: 35 km westl. Misurata 3. 5. 63 1 ♂; Cyr: Benghazi 2. 5. 63 1 ♂ — Saharo-sindische Art.

*moncreaffi* (Dgl. et Sc.), 1874: Trip: Serti 3. 5. 61 1 ♀ an Halophyten — Mitteleuropa, Mittelmeergebiet.

*retamae* E. Wgn., 1951: Trip: Kseia 3. 5. 61 1 ♀ — Bisher aus Ägypten. [*pusillus* Reut., 1883]: Lit: Siwa/Ägypten (Hoberlandt 1953) — Nordafrika.

*Pachylops* Fieber, 1858

*bicolor* (Dgl. et Sc.), 1877: Trip: Jebel Nefoussa Tarhuna 28. 4. 65 1 ♀ — Westeuropa, Nordafrika

*Brachynotocoris* Reuter, 1880

*cypricus* E. Wgn., 1961 subspec. *inermis* Linnav. 1965: Lit: Cyr: El Merj-Gubba 31. 8. 62 (Linnavuori 1965) an *Olea europea* L. — Die Art kommt in Israel und auf Zypern vor, die subspec. bisher nur in Libyen.

*Platycranus* Fieber, 1870, subgen. *Platycranus* s. str.

*putoni* Reut., 1879: Lit: Trip: Tripoli 27. 8. 62, Zuara-Tripoli 27. 8. 62 (Linnavuori 1965) an *Retama* — Nordafrika.

*eckerleini* E. Wgn., 1962: Trip: 10 km südl. Tripoli 30. 4. 61 45 ♂♂, 62 ♀♀, Serti 3. 5. 63 25 ♂♂, 32 ♀♀, Trip: 20 km östl. Tagiura 14. 4. 65 12 ♂♂, 23 ♀♀ Fezz: Uaddan 15. 4. 65 3 ♀♀, Jerma 18. 4. 65 5 ♂♂, 2 ♀♀ an *Retama monosperma* L. und *retam* Webb. — Bisher nur aus Nordafrika (Libyen, Algerien). Eremisch.

*Glaphyrocoris* Reuter, 1903 (*Linoceraea* Horvath, 1913)

[*lunigera* (Horv.), 1913]: Siwa/Ägypten (Hoberlandt 1953) — Bisher aus der Zentral-Sahara.

*Systellonotus* Fieber, 1858

*velox* Horv., 1907: Trip: Zuara 29. 4. 61 1 ♀ Jebel Nefoussa Bir Niggi 28. 4. 65 37 ♂♂ (Lichtanflug) in der Grassteppe — Bisher nur aus Tunesien.

*micelli* Reut., 1886: Lit: Trip: Homs 4. 13 (Mancini 1936) — Bisher aus Marokko, Algerien, Tunesien.

*thymi* Sign., 1859 (putoni Reut.): Trip: Jebel Nefoussa Tarhuna 28. 4. 65 1 ♂, Jebel Nefoussa Garian 29. 4. 65 5 ♀♀; Cyr: 10 km El Merj 22. 4. 65 3 ♀♀ — Mediterrane Art; in Frankreich nordwärts bis Paris.

*Camptotylus* Fieber, 1860

*yersini* (Mls. et R.), 1856: Fezz: Sebha Ain Kirim 17. 4. 65 sehr häufig an *Tamarix* auf aussalzendem Boden zusammen mit *Piocoris luridus* Fieb. — Mittelmeergebiet bis Turkestan.