

Tuponia Reuter 1878 subgen. *Chlorotuponia* E. Wgn., 1964

albomarginata Linnav., 1961: Trip: 28. 4. 65, Leptis Magna 28. 4. 65 16 ♂♂, 16 ♀♀. Lit: Hoberlandt (1953) meldet von der Oase/Siwa/Ägypten *T. hippophaes* Fieb. Es ist jedoch unwahrscheinlich, daß diese Art in Nordafrika vorkommt. Wahrscheinlich handelt es sich bei dem einzelnen Männchen, das der Meldung zugrunde liegt, um *T. albomarginata* Linnav.

michalki E. Wgn., 1951: Trip: Serti 3. 5. 63 1 ♂ — Mittelmeergebiet.

unicolor (Scott), 1872: Cyr: Benghazi 21. 4. 65 4 ♀♀ — Da nur Weibchen vorliegen, muß die Bestimmung als unsicher betrachtet werden. *T. unicolor* Scott bewohnt das westliche Mittelmeergebiet.

concinna (Reut.), 1875: Lit: Cyr: Jebel Soda, Valle Uosca 9.13 (Mancini 1936) Giarabub (de Bergevin 1930), Augila, Gialo (de Bergevin, Zavattari 1934) — Östliches Mittelmeergebiet bis Turkestan.

conspersa Reut, 1901, subsp. *fezzana* nov. subspec. E. Wgn.: Fezz: Uaddan 15. 4. 65 zahlreich; Cyr: Oasis Giarabub 24. 4. 65 zahlreich; Cyr: Zelten 26. 4. 65 1 ♀ — Nordafrika, Vorderasien.

noualhieri Reut., 1902: Trip: Bu-Ngem 15. 4. 65; Fezz: Uaddan 15. 4. 65, Rhoddua 17. 4. 65 regelmäßig und häufig an *Zygophyllum album* L. — Nordafrika.

Eurycranella Reuter, 1904

geocoriceps Reut., 1904: Fezz: Uaddan 15. 4. 65 32 ♂♂, 24 ♀♀ an *Casuarina equisetifolia* Forst., Jerma 18. 4. 65 1 ♀. Lit: Siwa/Ägypten (Hoberlandt 1953) — Nubien, Persien, Palästina.

nupta (Linnav.), 1961: Fezz: Uaddan 15. 4. 65 32 ♂♂, 1 ♀, Fokha 16. 4. 65 1 ♂, Jerma 18. 4. 65 1 ♂ an *Casuarina equisetifolia* Forst. — Bisher nur aus Palästina bekannt.

22. Familie Mesoveliidae Douglas et Scott, 1867

Mesovelia Mulsant, 1852

vittigera Horv., 1895: Fezz: Jerma 18. 4. 65 häufig; besonders auch die langflügelige Form auf Süßwasserlachen. Lit: Siwa/Ägypten (Hoberlandt 1953) — Mediterrane Art.

23. Familie Hebridae Fieber, 1851

Hebrus Curt, 1833

pusillus (Fall.), 1807: Lit: Fezz: Ghat 3.34 (Mancini 1936a) — Europa, Mittelmeergebiet.

24. Familie Velidae Dohrn, 1859

Velia Latreille, 1804

rhadamantha (Hob.), 1941 subspec. *cyrenaica* (Tam.), 1965: Cyr: Cyrene 22. 4. 65 88 ♀♀, 42 ♂♂, und viele Larven auf den Quellbecken der Apolloquelle. — Die Art bewohnt die Balkanhalbinsel, Kreta, die Zykladen. Die subspec.