

scentibus. Oculi obscure rubri, ad margines dilutiores. Pronotum scutellumque distincte punctata, in medio et ad margines ipsos saepius flavida, utrimque prope medium et interdum antice posticeque sordide lutea. Hemelytra ad costam perparum ruguloso-punctata; corio medio apicem versus margineque apicali ipso parum infuscatis. Rostrum testaceum, apice nigricans. Sternum testaceum, virescenti, rufescenti et fusciscenti-variegatum. Dorsum abdominis maximam ad partem dilute sanguineum. Venter dense albido-pubescenti, in disco flavidus, ad latera late laete sanguineus.

Patria: Republicae Argentina et Uruguayensis.

Poseo dos ejemplares de esta especie que he recogido en Buenos Aires (Palermo) y en la Banda Oriental del Uruguay, cerca del Rio Corralito.

Gen. TRACHELOMIRIS REUT.

Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1875. N° 9. p. 61.

67 (146). **Trachelomiris scenicus** (STÅL) REUT.

*Miris scenicus* STÅL, Freg. Eug. Resa. Ins. p. 254. 90 (1859). — WALK., Cat. VI, p. 52. 22 (1873). — BERG, Anal. Soc. Cient. Arg. VI, p. 268. 146 (1878) et Hem. Arg. p. 118. 146 (1879).

*Trachelomiris scenicus* REUT., Öfv. Vet.-Akad. Förh. 1875. N° 9. p. 61. (1875). Obs.

Queda señalada la posición genérica que ocupa actualmente esta especie. Tiene una distribución geográfica mas vasta que la indicada anteriormente por mí, encontrándose también en la Banda Oriental del Uruguay, en la Provincia de Santa Fé y al Sur y Oeste de la de Buenos Aires.

CORPOMIRIS n. gen.

Corpus valde elongato-ovale, supra ubique punctatum, glabrum, infra cum antennis pedibusque subgladrum, sat durum. Caput breviusculum, latius quam longius; fronte antice parum elevato-