

transversales algo interrumpidas del dorso abdominal y del vientre. El esternon y el vientre están provistos también de una línea longitudinal lateral roja. Las antenas, las extremidades de los fémures y tibiae y la de los hemélitros rudimentarios son de un rojo oscuro; el mismo tinte hace ver una línea media longitudinal del dorso abdominal. Las partes basales de los dos primeros artículos antenares son testáceas.

En cuanto á la estructura, la cabeza es casi como en la imágen, siendo la frente algo más retirada. El pronoto, que en su parte anterior no es muy angosto, lleva cerca de su parte media dos impresiones ovales ó semilunares.

Se encuentra en el *Gynerium argenteum* NEES (*Arundo Sellowiana* SCHULT.).

Div. PHYTCORARIA REUT.

Miridiaria, Loparia, Dyoncaria et Phytocoraria REUT. olim.

Bih. Vet.-Akad. Handl. III, 1, p. 5 et 6 et Rev.
Crit. Caps. p. 76 et 19 (1875).

Gen. PHYTCORIS FALL., H.-S., REUT.

FALL. p., Hem. Suec. I, p. 83 (1829). — H.-S.,
Wanz. III, p. 36 (1835). — FIEB., Wien. Ent.
Monatschr. II, p. 306 (1858) et Eur. Hem. p. 65
et 258 (1861). — REUT., Bih. Vet.-Akad. Handl.
III, 1, p. 10 et Rev. Crit. Caps. p. 79 et 19 (1875).

69. **Phytocoris bonaërensis** n. sp.

♂ et ♀: Sordide albidí aut testacei, supra fusco nigricantique variegati, subtus fuscescentes, ex parte viridescenti-variegati; pronoto, parte antica excepta, antennis apicem versus, clavo, apicibus corii cuneique et femoribus posticis, basi excepta, infuscatis, his albidí aut viridescenti-variegatis; antennarum articulo primo rufescenti, fusco-adperso, secundo rufo, basi testaceo et apice fusco, tertio ad basin albo; costa apicibusque corii cuneique fusco-maculatis; membrana fuscescenti-marmorata; pedibus viridescenti-albidis, fusco-