

maculatis vel adpersis. — Long. corp. 4, cum hem. 5; lat. hum. 1,3 mm.

Caput sat productum, testaceo fuscoque variegatum aut transversim fuscescenti-striatum; fronte brevi. Antennarum articulo basali capite cum pronoto ad unum nonnihil brevior, secundo primo duplo longiore. Oculi prominuli. Pronotum collariferum, antrorsum declivi-convexum et angustatum, marginibus lateralibus leniter sinuatis, margine postico generaliter albido, antice fusco-marginato. Scutellum basi apiceque depressum. Hemelytra corpore admodum longiora, costam versus fusco-marmorata vel adpersa, in costâ ipsa obscure fusco-maculata. Dorsum abdominis fuscum, albido flavidoque variegatum. Venter flavido subsericeus.

Patria: Provincia Bonaerensis.

Se acerca por algunos caracteres al *Phytocoris pallidulus* BLANCH. de Chile, con que lo comparé en Paris. Se distingue de este por la coloracion mas oscura, por las manchas de las patas y, sobre todo, por la estructura y coloracion de las antenas y del pronoto.

Los tres ejemplares que poseo de esta especie, fueron recogidos por los Sres. SPERGAZZINI y LYNCH, en Chascomus y Chacabuco.

70 (375). **Phytocoris? pallidus** BERG.

† *Resthenia pallida* BERG, Hem. Arg. p. 291. 375 (1879) et Anal. Soc. Cient. Arg. IX, p. 19. 375 (1880).

Coloco esta especie ahora en el género *Phytocoris*, al que corresponde mejor que á *Resthenia*, sin embargo, se distingue de él por el primer artículo de las antenas bastante engrosado y algo tuberculoso. No teniendo ejemplares bien conservados, no puedo entrar en un exámen prolijo.

Gen. RESTHENIA SPIN.

71. **Resthenia uruguayensis** n. sp.

♂: Valde oblongus, supra cum antennis niger, capite, clypeo marginibusque frontis exceptis, collare