

Este cápsido ha sido observado tambien últimamente en Buenos Aires y en Chacabuco, de manera que pertenece igualmente á la fauna argentina.

78 (152). **Lygus vittiscutis** STÅL.

Deraeocoris vittiscutis STÅL, Rio de Jan. Hem. I, p. 48.4 (1860).

Capsus vittiscutis WALK., Cat. VI, p. 102 et 103. 193 (1873).

† *Capsus (Deraeocoris) vittiscutis* BERG, Anal. Soc. Cient. Arg. VI, p. 271. 152 (1878) et Hem. Arg. p. 121. 152 (1879).

Es muy próximo al *Lygus fasciatus* REUT., de que se distingue principalmente por la carencia de los anillos ferrugíneos de los fémures y tibias.

79. **Lygus cetratus** n. sp.

♂ et ♀: Oblongo-ovales, glabri, nitidi, sat distincte, praesertim in hemelytris, punctati, olivacei; vitta laterali sat lata sublaevigata scutelli laete viridi; antennis, parte media (qua vittam fingente) scutelli, margine interno suturaque clavi, angulo interno corii venisque membranae ex parte, nec non dorso abdominis, connexivo excepto, fuscis; subtus ad latera viridescentes, ventre utrimque obsotete luteo-vittato, pedibus testaceis, vix lutescenti-adsper-sis, femoribus posticis supra prope apicem perparum infuscatis. — Long. corp. 3,5-4 cum hem. 4,5-5 mm.

Caput vix punctulatum, inter oculos lenissime impressum. Oculi postice testacei. Antennae dimidio corporis admodum longiores, articulo primo capite vix brevior, secundo primo triplo longiore, ante medium annulo rufo valde obsoleto ornato. Rostrum coxas posticas paullo superans. Pronotum punctulatum, antice callosum, collare angustissimo instructum. Scutellum medio longitrorsum elevatum et punctatum, in vitta viridi, praecipue ad margines, perparum punctulatum. Hemelytra clavo corioque punctata, hoc medio viridi-mi-