

81 (158). **Poeciloscytus piceus** BERG.

† *Resthenia picea* BERG, Anal. Soc. Cient. Arg. VI, p. 275. 158 (1878)  
et Hem. Arg. p. 125. 158 (1879).

Esta especie ha sido puesta erróneamente en el género *Resthenia*; pertenece á *Poeciloscytus*.

Ejemplares últimamente coleccionados en Buenos Aires, en las Conchas, en Chascomus y en el Tandil (en el último lugar por el Dr. HOLMBERG), me demuestran que esta especie es muy variable en la coloracion de la parte superior. Esta es en algunos negra, con excepcion de las pequeñas manchas de la cabeza, del borde pronotal, de la costa de los hemélitros y de los nervios de la membrana. En otros los hemélitros son muy verdosos en la mital costal del córion; y algunos tienen de un tinte amarillento la cabeza, las antenas, la parte anterior del pronoto y la mitad costal de los hemélitros, siendo provistos de manchas oscuras los órganos primeramente indicados. La pubescencia es á veces muy densa y amarillenta. Las patas son en algunos individuos muy claras y apenas manchadas. Tambien el abdómen varia en su coloracion general, siendo negruzco, fusco ó verdoso.

82. **Poeciloscytus Eryngii** n. sp.

♂ et ♀: Supra carnei aut lateritii, ex parte flavido fuscescentique variegati, opaci, aureo-sericei; antennis, articulo tertio maximam ad partem excepto, collare, partibus media et antica subcallosa pronoti, costa corii, margine cunei venisque membranae flavidis, cuneo ipso sanguineo; maculis duabus parvis antico-lateralibus saepissimeque punctis duobus antico-mediis pronoti nigris, angulis lateralibus vel humeris pronoti valde infuscatis, interdum quasi macula nigra ornatis, scutello sat rubro, dorso abdominis flavido carneo-fasciato; infra cum pedibus flavidi, rubro-variegati, ventre ex parte rubro-fasciato aut apice marginibusque rubris; femoribus prope apicem rubro-biancula-