

Los cinco ejemplares que poseo fueron recogidos en Chascomus por el Sr. LYNCH, y por mí en Buenos Aires y en la Banda Oriental del Uruguay, cerca del Rio Corralito.

Se encuentra en la *Manzanilla silvestre* (*Anthemis Cotula* LINN.).

Div. ECCRITOTARSARIA REUT. in litt.

Caput nutans vel verticale, rarius parum productum.

Antennarum articulis duobus basalibus sat incrassatis, duobus terminalibus valde tenuibus. Rostrum admodum crassum et breve, generaliter coxas intermedias non attingens, rarissime ad coxas posticas extensum. Membrana uniareolata, areola longe triangulari. Alae hamo destitutae. Tarsi basi graciles, apicem versus sensim ampliati et incrassati.

Gen. ECCRITOTARSUS STÅL.

85. **Eccritotarsus erythronotus** n. sp.

♂ et ♀: Oblongiusculi, nitidi, obsoletissime punctulati, dense brevissimeque pubescentes; capite, antennis, apice scutelli, clavo, basi excepta, mesostethio, metastethio, abdomine tarsisque apicem versus nigris, interdum rufo-micantibus; pronoto, scutello, corio cum cuneo, rostro maximam ad partem, prostethio pedibusque cinnabarinis; membrana dilute fuliginosa, iridiscenti. — Long. corp. cum hem. 3,5-4; lat. hum. 1,3-1,5 mm.

Caput verticale, pubescens. Antennarum articulo basali capite multo longiore, basi gracillimo, flavido, secundo primo plus quam duplo longiore. Rostrum coxas anticas paullo superans, articulo basali ad coxam anticam extensum, duobus apicalibus brevibus, nigris. Pronotum antrorsum valde declivi-convexum, late collariferum et antice leniter bicallosulum. Scutellum medio longitudinaliter distincte impressum, apice clavoque hemelytro-