

los artículos terminales de las antenas son mas oscuros. La parte terminal del artículo basilar de las antenas y la extremidad de los fémures son blanquizcas, miéntras que la mitad apical de las tibias y los dos primeros artículos de los tarsos son testáceos; todo casi como en la imágen. En los hemélitros rudimentarios se ve tambien la mancha sutural amarillenta, y ademas las fajas ó manchas de un tinte blanco azulado.

Las antenas son relativamente mas cortas, sobre todo su artículo terminal. La márgen del vértice es bastante aguda y se inclina arriba del borde anterior del pronoto. Este último es casi semi-esferoidal, á causa de las líneas curvas de los bordes laterales y posterior y de su convexidad. El escudete tiene posteriormente una elevacion pronunciada. El abdómen es ovoidal y muy convexo, con la base muy estrechada. Todo el cuerpo lleva pelos erizados bastante largos.

MYRMECOZELOTES n. gen.

Corpus elongatum, parum setulosum, ad basin abdominis longe valdeque constrictum, subpetiolatum. Caput sat declive, ante oculos longe acuminato-productum; vertice postice declivi et convexiusculo, sat subito angustato; clypeo convexo a fronte per impressionem separato; loris sat longis, bene discretis, haud totis oclulis; gula longissima, obliqua. Oculi parum convexi. Rostrum coxas anticas non vel vix superans, articulo primo tantum gulam attingente. Antennarum articulo primo brevissimo, secundo longissimo, lineari vel apicem versus sensim nonnihil incrassato, tertio secundo et quarto tertio plus quam tertia parte brevioribus. Pronotum antrorsum valde angustatum, sat declive et convexum, valde ante medium carinula transversa instructum, margine antico incrassato-elevato, postico valde sinuato, lateribus leniter sinuatis. Scutellum spina valida plus minusve erecta armatum. Hemelytra ex parte nitida, ex parte opaca, medio valde angustata et ibidem albo-maculata (an semper?). Alarum areola hamo destituta, unco costali valido. Pedes longi, parum spinuloso-setosi; tibiis