

93 (374). **Cyrtopeltis chlorogastra** BERG.

† *Capsus chlorogaster* BERG, Hem. Arg. p. 290. 374 (1879) et Anal. Soc. Cient. Arg. IX, p. 18. 374 (1880).

La he recogido tambien en la Banda Oriental del Uruguay, cerca del Rio Corralito, en el mes de Enero de 1882.

Anotacion. — Acerca del género *Cyrtopeltis* me escribe el Sr. REUTER lo siguiente: «*Characteres omnes generis Cyrtopeltis FIEB., solum rostrum brevius, coxas intermedias haud superans. (Character specificus, non genericus).*»

Div. ONCOTYLARIA REUT.

Bih. Vet.-Akad. Handl. III, 1, p. 7 et Rev. Crit. Caps. p. 77 et 138 (1875).
Hem. Gym. Eur. II, p. 193 (1879).

Gen. CONOSTETHUS FIEB., REUT.

Conostethus FIEB., Wien. Ent. Monatschr. II, p. 318 (1858) et Eur. Hem. p. 72 et 299 (1861). — REUT., Bih. Vet.-Akad. Handl. III, 1, p. 40 et Rev. Crit. Caps. p. 94 et 141 (1875) et Hem. Gym. Eur. II, p. 264 (1879).
Xenocoris FIEB., Wien. Ent. Monatschr. II, p. 315 (1858) et Eur. Hem. p. 71 et 288 (1861). — REUT., Bih. Vet.-Akad. Handl. III, 1, p. 40 et Rev. Crit. Caps. p. 94 (1875).

94. **Conostethus? pamparum** n. sp.

♂: Dilute flavidus, ex parte virescens, tenuissime pubescens, capite pronotoque saturatiore flavidis, hoc tantum antice, illo supra luteo aut fulvo-maculato; vertice postice maculis duabus circularibus fulvis, ex parte fuscis et alteris duabus anticis minoribus ornato; fronte transversim lutescenti-striolata, antice posticeque magis colorata; clypeo macula basali lutea praedito; antennis, rostro, pedibus maculisque duabus minutis anticis pronoti lutescentibus; pronoto postice fulvido, medio obsolete