

flavido-interlineato; scutello angulis lineaque media obsoteta sulphureis; clavo, corio cuneoque dilutissime virescenti-flavidis; membrana ex parte infuscata, ex parte albo-maculata; pectore abdome que flavidis.—Long. corp. 2,2, cum hem. 3; lat. hum. 0,8 mm.

Patria: Provincia Bonaerensis.

Un solo ejemplar ♂ de Chascomus, recogido por el Sr. SPEGAZZINI.

Por hallarse el ejemplar incompleto, quedan dudas acerca de su posicion genérica. Segun el Dr. REUTER parece pertenecer al género en que lo coloco.

#### Div. PLAGIOPNATHARIA REUT.

Bih. Vet.-Akad. Handl. III, 1, p. 7 et Rev. Crit.  
Caps. p. 77 et 148 (1875).  
Hem. Gym. Eur. p. 15 (1878).

#### Gen. AGALLIASTES FIEB., REUT.

*Halticus* p. BURM., *Chlamydatus* p. CURT., *Astemma* p. AM. et SERV. et *Agalliaastes* p. FIEB. (sec. REUT.).

*Plagiognathus* subg. *Agalliaastes* REUT., Bih. Vet.-Akad. Handl. III, 1, p. 59 et Rev. Crit. Caps. p. 100 et 186 (1875).

*Agalliaastes* REUT., Hem. Gym. Eur. I, p. 60 (1878).

#### 95. *Agalliaastes argentinus* n. sp.

♀; Ovata, supra picea, nitida, subtiliter grisescenti-pubescens, subtus cum femoribus castanea, subtilissime pubescens; antennis fuscis, articulo primo basique secundi albidis; clavo medio late longe que et cuneo ad basin anguste diaphanis; membrana vitrea, iridescenti, medio perparum infuscata; dorso abdominis ventreque rufo-castaneis, ad basin multo pallidioribus; tibiis albidis, nigro-spinosis; tarsorum articulo terminali fusco.—Long. corp. 4,7, cum hem. 2,5; lat. hum. ca. 0,7 mm.

Caput et pronotum obsoletissime punctulata, illud vertice prope marginem subtiliter transver-