

96. **Spanagonicus provincialis** n. sp.

♂: Niger, nitidiusculus, subtilissime grisescenti-pubescent, articulo basali antennarum, tibiis apiceque aut triente terminali femorum testaceis; clavo corioque sat diaphanis; membrana dilutissime infuscata, ad apicem cunei macula pellucida albida notata. — Long. corp. 4,6, cum hem. 2,6; lat. hum. ca. 0,9 mm.

Vertex capitis ante marginem posticum foveolato-impressum. Pronotum subalutaceum, ante medium punctis duobus minutis impressis praeditum. Scutellum ante medium impressum. Hemelytra alutacea, nigro-picea; membrana prope angulum internum minus infuscata. Tibiae nigro-spinulosae.

Patria: Provincia Bonaerensis.

Un solo ejemplar de Chacabuco, recogido por la misma persona que la especie precedente.

Gen. **ATRACTOTOMUS** FIEB.

FIEB., Wien. Ent. Monatschr. II, p. 317 (1858) et Eur. Hem. p. 71 et 294 (1861).

REUT., Bih. Vet.-Akad. Handl. III, 1, p. 46 et Rev. Crit. Caps. p. 98 et 156 (1875) et Hem. Gym. Eur. I, p. 92 (1878).

97. **Atractotomus egregius** n. sp.

♂ et ♀: Nigri, nitidi, parce albido-hirsuti; antennis rubescenti-nigris, articulo tertio basin versus albido, ejus apice et articulo terminali fuscescentibus; rostro maxima ex parte tibiisque, triente basali excepto, rarissime tibiis anticis et intermediis totis, albidis, concoloriter spinulosis; capite apice, bucculis intus rostroque ad basin interdum rubris; oculis rubescentibus; corio in medio api-